

ERELZI®-LÄÄKKEEN POTILASKORTTI

Tämä potilaskortti sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, joista sinun tulee tietää ennen Erelzi®-hoidon aloittamista ja Erelzi®-hoitosi aikana. Jos jokin jää epäselväksi, pyydä lääkärinä selittämään asia sinulle.

- ▶ On tärkeää, että lääkäri tai sairaanhoitaja opettaa sinulle oikean pistostekniikan ennen kuin käytät injektioykynää.
- ▶ Näytä tämä kortti kaikille sinua hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille.
- ▶ Lue myös lisätietoa Erelzi®-valmisteen pakkausselosteesta.



▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

KÄYTTÖ LAPSILLE JA NUORILLE (PAINO ALLE 62,5 KG)

Erelzi® ei sovi alle 62,5 kg painaville lapsille eikä nuorille. Käänny lääkärin puoleen, jos sinulla on kysyttävää asiasta.

Älä käytä Erelzi®-lääkettä, jos olet allerginen etanerseptille tai lääkkeen jollekin muulle aineelle.

INFEKTIOT

Erelzi®-hoito voi suurentaa vakavien infektioiden, sepsiksen, tuberkuloosin ja opportunisti-infektioiden riskiä (myös invasiivisten sieni-infektioiden, listerioosin ja Legionella-infektion riskiä).

- ▶ Jos sinulla on infektio, sinulle ei saa antaa Erelzi®-hoitoa. Kysy neuvoa lääkäriltä, jos olet epävarma.
- ▶ Ota heti yhteys terveydenhuoltoon, jos sinulla on infektiin viittaavia oireita kuten kuumetta, pitkittyvää yskää tai laihtumista tai jos yleisvointisi heikkenee.
- ▶ Sinut tulee testata tuberkuloosin varalta. Pyydä lääkärinä merkitsemään tuoreimman tuberkuloositestisi päivämäärä ja tulos tähän:

TESTI

PÄIVÄ

TULOS

TESTI

PÄIVÄ

TULOS

- ▶ Pyydä lääkäriä kirjaamaan tähän muut käyttämäsi lääkkeet, jotka voivat suurentaa infektoriskiä.

KONGESTIIVINEN SYDÄMEN VAJAATOIMINTA

- ▶ Jos sinulle kehittyy kongestiiviseen sydämen vajaatoimintaan viittaavia oireita tai aiemman kongestiivisen sydämen vajaatoiminnan oireet pahenevat (esim. hengenahdistus, nilkkojen turvotus, pitkittynyt yskä tai uupumus), ota heti yhteys terveydenhuoltoon.
- ▶ Jos sinulla on kongestiivisen sydämen vajaatoiminta, sinulle ei saa antaa Erelzi[®]-hoitoa. Kysy neuvoa lääkäriltä, jos olet epävarma.

Erelzi -hoito voi suurentaa kongestiivisen sydämen vajaatoiminnan riskiä.

MUUTA TIETOA (TÄYTETÄÄN)

POTILAAN NIMI

LÄÄKÄRIN NIMI

LÄÄKÄRIN PUHELINNUMERO

Pidä tämä kortti aina mukanas Erelzi[®]-hoitosi aikana ja vielä 2 kuukauden ajan viimeisen Erelzi[®]-annoksen jälkeen, sillä haittavaikutuksia voi esiintyä vielä viimeisen Erelzi[®]-annoksen jälkeenkin.

On tärkeää, että sinä ja lääkäri merkitsette muistiin lääkkeen nimen ja eränumeron.

LÄÄKE

ERÄNUMERO