

ERELZI® PATIENTKORT

Detta patientkort innehåller viktig säkerhetsinformation som du måste vara medveten om innan du påbörjar Erelzi® och under behandlingen med Erelzi®. Be din läkare förklara för dig om du inte förstår informationen.

- ▶ Innan du använder injektionspennan är det viktigt att din läkare eller sjuksköterska lär dig tekniken.
- ▶ Visa detta kort vid varje tillfälle du uppsöker hälso- och sjukvård.
- ▶ Läs även bipacksedeln till Erelzi® för ytterligare information.



▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

ANVÄNDNING TILL BARN OCH UNGDOMAR (SOM VÄGER MINDRE ÄN 62,5 KG)

Erelzi® ska inte användas till barn och ungdomar som väger mindre än 62,5 kg. Fråga läkaren om du undrar något över detta.

Använd inte Erelzi® om du är allergisk mot etanercept eller något annat innehållsämne i läkemedlet.

INFEKTIONER

Behandling med Erelzi® kan öka risken för allvariga infektioner, sepsis, tuberkulos och opportunistiska infektioner (inklusive invasiv svampinfektion, listerios och Legionella).

- ▶ Om du har en infektion ska du inte behandlas med Erelzi®. Rådfråga läkaren om du är osäker.
- ▶ Om du får symtom som tyder på infektion, t.ex. feber, ihållande hosta, viktnedgång eller nedsatt allmäntillstånd, kontakta sjukvården omedelbart.
- ▶ Du ska vara testad för tuberkulos. Be läkaren notera datum och resultat för den sista tuberkuloskontrollen nedan:

TEST

DATUM

RESULTAT

TEST

DATUM

RESULTAT

- ▶ Be din läkare skriva ner vilka andra läkemedel du tar som kan öka infektionsrisken

HJÄRTSVIKT

- ▶ Om du får symtom **som tyder på hjärtsvikt eller om symptomen på en befintlig hjärtsvikt förvärras**, t.ex. andfåddhet, svullna fotleder, ihållande hosta eller trötthet, kontakta sjukvården omedelbart.
- ▶ Om du har hjärtsvikt ska du inte behandlas med Erelzi. Rådfråga din läkare om du är osäker.

Behandling med Erelzi kan öka risken för hjärtsvikt.

ÖVRIG INFORMATION (FYLL I)

PATIENTENS NAMN

LÄKARENS NAMN

LÄKARENS TELEFONNUMMER

Bär alltid detta kort med dig medan du behandlas med Erelzi® och i 2 månader efter den sista dosen Erelzi®, eftersom biverkningar kan uppkomma även efter den sista Erelzi®-dosen.

Det är viktigt att du och läkaren skriver upp läkemedlets namn och batchnummer.

LÄKEMEDEL

BATCHNUMMER