

Potilaan muistutuskortti leuan luukuoliosta syöpään liittyvien tilojen hoidossa **Ibandronic Acid Accord 2 mg ja 6 mg** infuusiokonsentraateilla, liuosta varten

Tämä muistutuskortti sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, joihin sinun on syytä perehtyä ennen syöpään liittyvien sairauksien hoitoon tarkoitettua Ibandronic Acid Accord 2 mg ja 6 mg infuusiokonsentraatti, liuosta varten -valmisteen aloittamista ja valmisteen käytön aikana.

- Lääkäri on suositellut sinulle Ibandronic Acid Accord 2 mg tai 6 mg infuusiokonsentraatti, liuosta varten -valmistetta luuetäpesäkkeisiin tai luusyöpiin liittyvien luustokomplikaatioiden (esim. murtumien) ehkäisyyn ja vähentämään aikuispotilailla kalsiumin määrää veressä silloin, kun se on kasvaimen vuoksi liian suuri. Kasvaimet voivat kiihdyttää luun normaalia aineenvaihduntaa niin, että kalsiumin vapautuminen luusta lisääntyy. Tätä tilaa kutsutaan kasvaimen aiheuttamaksi hyperkalsemiaksi (TIH).

Potilailla, jotka ovat saaneet Ibandronic Acid Accord 2 mg tai 6 mg infuusiokonsentraatti, liuosta varten -valmistetta syöpään liittyvien sairauksien hoitoon, on esiintynyt hyvin harvinaisena haittavaikutuksena (enintään yhdellä potilaalla kymmenestä tuhannesta) leuan luukuoliota eli osteonekroosia (leukaluun vaurioitumista, ONJ). Leuan luukuoliota voi ilmetä myös hoidon lopettamisen jälkeen.

Leukaluun osteonekroosin kehittyminen on tärkeää pyrkiä estämään, koska se on kivulias sairaus ja sen hoitaminen voi olla vaikeaa. Pientääksesi leuan luukuolion riskiä sinun on huolehdittava muutamista varotoimenpiteistä.

ENNEN HOIDON ALOITTAMISTA:

- Pyydä lääkäriltäsi lisätietoja leuan luukuoliosta ennen hoidon aloittamista.
- Kysy lääkäriltäsi, pitäisikö sinun käydä hammastarkastuksessa ennen Ibandronic Acid Accord infuusiokonsentraatti, liuosta varten -hoidon aloittamista.
- Kerro lääkärille/hoitajalle (terveydenhuoltohenkilöstölle), jos sinulla on ongelmia suun tai hampaiden kanssa.

Suun alueen leikkaus (esim. hampaan poisto), säännöllisen hammashoidon puute, iensairaus, tupakointi, erilaiset syöpähoidot tai aiempi bisfosfonaattihoito (luustohäiriöiden hoitoon tai ennaltaehkäisyyn) voivat suurentaa leuan luukuolion riskiä.

HOIDON AIKANA:

- Sinun on pidettävä huolta hyvästä suuhygieniasta ja siitä, että hammasproteesisi istuu kunnolla, sekä käytävä säännöllisesti hammastarkastuksessa.
- Jos saat hammashoitoja tai olet menossa suun alueen leikkaukseen (esim. hampaan poisto), kerro siitä lääkärille ja kerro hammaslääkärille, että saat Ibandronic Acid Accord infuusiokonsentraatti, liuosta varten -valmistetta.
- Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin ja hammaslääkəriin, jos sinulla on mitä tahansa ongelmia suun tai hampaiden kanssa, esim. hampaiden heiluminen, kipu tai turvotus, haavaumien parantumattomuus tai märkiminen, sillä ongelmat saattavat olla oire leuan luukuoliosta.

Katso lisätietoja lääkkeen mukana toimitettavasta pakkausselosteesta.

HAITTAVAIKUTUKSISTA ILMOITTAMINEN

Voit auttaa ilmoittamalla mahdollisista haittavaikutuksista. Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan Accordille: +44 0208 901 3370 tai safety@lambda-cro.com tai Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle: www.fimea.fi, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa Ibandronic Acid Accord -valmisteen turvallisuudesta.