

Tarkistuslista 1: Tarkistuslista käytettäväksi ennen guanfasiinihoidon aloittamista

Tarkistuslista on tarkoitettu tueksi Intuniv®-valmisteen (guanfasiini) käytön oikeaan aloittamiseen hoitaessasi tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriöstä (ADHD) kärsiviä 6–17-vuotiaita lapsia ja nuoria, kun stimulantit eivät sovellu heille, he eivät siedä stimulantteja tai kun stimulantit eivät ole olleet tehokkaita.

Kuten valmisteyhteenvedossa on esitetty, tietyt samanaikaissairaudet, esimerkiksi sydän- ja verisuonisairaudet tai niiden oireet, voivat estää guanfasiinin käytön tai edellyttää erityistä huomiota. Tämän tarkistuslistan käyttäminen on suositeltavaa yhdessä Intuniv®-valmisteyhteenvedon kanssa (**saat sen näkyviin napsauttamalla tästä**).

Lataa ja tulosta tarkistuslista ennen tapaamista. Et voi tallentaa potilaskohtaisia tietoja verkkosivustolle. Täytetty tarkistuslista voidaan dokumentoida potilasasiakirjoihin.

Kun käytä läpi tarkistuslistaa, saatat olla hyödyllistä myös keskustella potilaan kanssa Intuniv®-valmisteen pakkausselosteesta (**saat sen näkyviin napsauttamalla tästä**).

Ennen guanfasiinihoidon aloittamista

Ensimmäisen arvioinnin päivämäärä:	
Potilaan nimi:	
Syntymäaika:	
Ikä:	Sukupuoli:

Vasta-aiheet (Intuniv®-valmisteyhteenvedon kohta 4.3 – Vasta-aiheet):

Potilaille, joilla on jokin seuraavista tiloista tai komorbiditeeteista ja/tai jotka käyttävät samanaikaisesti muita lääkkeitä, ei pidä antaa guanfasiinia:

	Arvioitu
• Tunnettu yliherkkyys guanfasiinille tai jollekin apuaineelle	<input type="checkbox"/>
Apuaineet (katso Intuniv®-valmisteyhteenvedon kohta 4.4 – Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet – Apuaineet)	
• Sisältää laktoosia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, saamelaisilla esiintyvä laktaasin puutos tai glukoosigalaktoosi imeytymishäiriö, ei tule käyttää tätä lääkettä.	<input type="checkbox"/>

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet (Intuniv®-valmisteyhteenvedon kohta 4.4 – Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)

Harkitse seuraavia seikkoja ennen guanfasiinihoidon aloittamista:

Sukuanamneesi	Arvioitu
• Suvussa esiintyneet äkilliset sydänkuolemat / selittämättömät kuolemat	<input type="checkbox"/>

Potilaan anamneesi ja lääkärintarkastus	Arvioitu
Kardiovaskulaariset	
• Aiemmat kardiovaskulaariset sairaudet, kuten hypotensio, haarakatkos, bradykardia tai sydän- ja verisuonitauti, tai potilaat, joilla on ollut pyörtymistä tai pyörtymiselle altistava tila, kuten hypotensio, ortostaattinen hypotensio, bradykardia tai nestehukka	<input type="checkbox"/>
• Perussairaus, joka saattaa pahentua verenpaineen tai sykkeen alenemisen vuoksi	<input type="checkbox"/>
• Tunnettu aiempi QT-välin pidentyminen, kääntyvien kärkien takykardian riskitekijöitä (esim. haarakatkos, bradykardia ja hypokalemia) tai potilaat, jotka käyttävät QT-väliä pidentäviä lääkkeitä	<input type="checkbox"/>
• Verenpaine ja syke (pulssi) on arvioitava ja kirjattava	<input type="checkbox"/>
Arvioitu	
Psykiatriset/neurologiset sairaudet	
• Itsemurha-ajatukset	<input type="checkbox"/>
• Lisääntynyt sedaation ja uneliaisuuden riski	<input type="checkbox"/>
• Potilaita on neuvottu olemaan käyttämättä raskasta kalustoa, ajamatta ja pyöräilemättä, kunnes on selvillä, miten he reagoivat guanfasiinihoitoon	<input type="checkbox"/>
• Potilaat eivät saa juoda alkoholia käyttäessään guanfasiinia	<input type="checkbox"/>
Vaikutukset pituuteen, painoon ja painoindeksiin	
• Pituus, paino ja painoindeksi on kirjattava (käytä oheista lomaketta)	<input type="checkbox"/>

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveystieteiden ammattilaisia pyydetään siksi ilmoittamaan kaikista epäilyistä haittavaikutuksista valmisteyhteenvedon kohdassa 4.8 luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

Tämä tarkistuslista on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön yhdessä Intuniv®-valmisteen valmisteyhteenvedon kanssa.

Tämän työkalun on kehittänyt Shire osana Intuniv®-valmisteen liittyvää riskinhallintasuunnitelmaa.

Ilmoita kaikista epäilyistä haittavaikutuksista Fimeaan ja Shirelle osoitteessa globalpharmacovigilance@shire.com

Valmistelupäivämäärä: huhtikuu 2016

FI/EXA/INT/15/0005

Shire

© Shire 2016

Mahdolliset yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa (katso Intuniv® -valmisteyhteenvedon kohta 4.5 – Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset)

	Arvioitu
• CYP3A4- ja CYP3A5-estäjät (mukaan lukien greippimehu, tietyt antibiootit ja viruslääkkeet)	<input type="checkbox"/>
• CYP3A4-indusorit (mukaan lukien mäkikuisma)	<input type="checkbox"/>
• Guanfasiini vaikuttaa sykkeeseen, eikä sitä sen vuoksi yleisesti suositella käytettävän samanaikaisesti QT-aikaa pidentävien lääkkeiden kanssa	<input type="checkbox"/>
• Verenpainelääkkeet (mukaan lukien guanetidiini tai muut verenpainelääkkeet)	<input type="checkbox"/>
• Valproiinihappo	<input type="checkbox"/>
• Keskushermostoa lamaavat lääkeaineet (esim. alkoholi, sedatiivit, unilääkkeet, bentsodiatsepiinit, barbituraatit ja psykoosilääkkeet)	<input type="checkbox"/>

Kun olet tehnyt edellä olevan arvioinnin, kirjaa lähtötason arvot jatkuvaa seurantaa varten tarkoitettuun lomakkeeseen **(saat sen näkyviin napsauttamalla tästä)**.