

Din vägledning för

KEYTRUDA[®]

(pembrolizumab)

Information till patienter

- ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får.

Din läkare har förskrivit pembrolizumab för behandling av cancer. Läs bipacksedeln för information om vad pembrolizumab är och vad det används för. Denna broschyr är avsedd för att fungera som en vägledning till din behandling och beskriver vad som kan inträffa när du behandlas med pembrolizumab.

I denna broschyr beskrivs några av de biverkningar som kan uppstå när du behandlas med pembrolizumab, och hur du som patient kan vara uppmärksam på dem. Du får också veta varför det är viktigt att omedelbart rapportera alla symtom till din läkare.

Klistra in
patientkortet
här

LÄKARENS NAMNSTÄMPEL

Pembrolizumab är ett läkemedel som används för att behandla cancer.

Behandling med pembrolizumab kan orsaka biverkningar. Pembrolizumab är en behandling som verkar genom att hjälpa ditt immunförsvar bekämpa din cancer.

Innan du får pembrolizumab

Tala om för din läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Se till att din läkare får kännedom om att du:

- Har en autoimmun sjukdom (ett tillstånd där kroppen angriper sina egna celler).
- Har lunginflammation (pneumoni eller pneumonit).
- Tidigare har behandlats med ipilimumab, ett annat läkemedel för behandling av en viss typ av cancer, och upplevt allvarliga biverkningar på grund av detta läkemedel.
- Reagerat med allergisk reaktion vid behandling med andra monoklonala antikroppar.
- Har eller har haft en kronisk virusinfektion i levern, inklusive hepatit B (HBV) eller hepatit C (HCV).
- Har humant immunbristvirus (hiv)-infektion eller förvärvat immunbristsyndrom (AIDS).
- Har leverskada.
- Har njurskada.
- Har genomgått en organtransplantation eller en benmärgstransplantation (stamcellstransplantation) där donerade (allogena) stamceller använts.
- Om du tar läkemedel som kan försvaga immunsystemet. Exempel på sådana är kortikosteroider, såsom prednison.
- Om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.
- Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn.
- Om du är kvinna och i fertil ålder, eftersom du då måste använda en effektiv preventivmetod under behandling med pembrolizumab och i minst 4 månader efter din sista dos.
- Om du ammar eller planerar att amma.

Vad du bör veta om din behandling

Hur du ges pembrolizumab

Pembrolizumab kommer att ges till dig på ett sjukhus eller mottagning under överinseende av en erfaren läkare. Du kommer att ges pembrolizumab genom en infusion i en ven.

Infusionen kommer att pågå i 30 minuter. Läs bipacksedeln för den rekommenderade dosen av pembrolizumab.

Pembrolizumab ges vanligtvis en gång var 3:e vecka. Din läkare beslutar om hur många behandlingar du behöver.

Ibland kan man se en ökning av tumörstorleken eller tillkomst av små nya förändringar inom de första månaderna av behandlingen, innan tumören börjar krympa. Om tumören initialt förefaller tillväxa, kan din läkare, om din hälsa är stabil, ändå fortsätta behandlingen med pembrolizumab och sedan utvärdera igen för att se om du svarar på behandlingen.

Det är viktigt att du kommer till dina schemalagda läkarbesök så att din läkare kan utvärdera behandlingseffekten och ge pembrolizumab. Om du inte kan komma till ett planerat besök, kontakta din läkare direkt för att boka en ny tid.

Möjliga biverkningar

Liksom alla läkemedel kan pembrolizumab orsaka biverkningar, men alla patienter behöver inte få dem. När du behandlas med pembrolizumab kan du få vissa allvarliga biverkningar. Du kan få mer än en biverkning på samma gång. Det är mycket viktigt att du berättar för din läkare om eventuella symtom som du känner av när du behandlas med pembrolizumab. Din läkare kan ordinera andra läkemedel för att förhindra allvarligare komplikationer och lindra symtom på biverkningar. Din läkare kan senarelägga nästa dos av pembrolizumab eller avbryta behandlingen med pembrolizumab.

Tala omedelbart om för din läkare om du märker något av dessa symtom

Biverkning	Tecken och symtom
Lungbesvär (inflammation i lungorna, kan vara dödligt)	<ul style="list-style-type: none">• Andnöd• Smärta i bröstet• Hosta
Tarmbesvär (inflammation i tarmarna)	<ul style="list-style-type: none">• Diarré eller tätare tarmtömningar än normalt• Svart, tjärliknande, klabbig avföring eller avföring med blod eller slem• Kraftigt magsmärta eller ömmande mage• Illamående eller kräkningar
Leverproblem (inflammation i levern)	<ul style="list-style-type: none">• Illamående eller kräkningar• Minskad aptit• Smärta på höger sida av magen• Guldfärgad hud eller gula ögonvitor• Mörk urin• Större benägenhet att få blödningar eller blåmärken än normalt
Njurproblem (inflammation i njurarna)	<ul style="list-style-type: none">• Förändringar i mängden eller färgen på din urin
Problem med hormontörklar (speciellt sköldkörteln, hypofysen, binjuren)	<ul style="list-style-type: none">• Hjärtklappning• Viktminskning eller viktökning• Ökad svettning• Hårfall• Köldkänsla• Förstoppning• Djupare röst• Muskelsmärter• Yrsel eller svimning• Huvudvärk som inte försvinner eller ovanlig huvudvärk
Typ 1-diabetes	<ul style="list-style-type: none">• Ökad aptit eller törst• Behov av att kissa oftare• Viktminskning
Hudproblem (inflammation i huden, kan vara dödligt)	<ul style="list-style-type: none">• Hudutslag• Klåda• Hudblåsor• Fjällande hud eller sår• Sår i munnen, i näsan, i halsen eller kring könsorganen
Problem i andra organ	<ul style="list-style-type: none">• Ögon: synförändringar• Muskler: muskelvärk eller svaghet• Hjärtat: andfåddhet, oregelbundna hjärtslag, känsla av trötthet eller smärta i bröstet• Bukspottkörteln: buksmärta, illamående och kräkning• Nerver: tillfällig inflammation som orsakar smärta, svaghet och förlamning i armar och ben• Avstötning av transplanterat organ efter behandling med pembrolizumab (tala om för din läkare om du har genomgått en organdonation)• Rubbning i immunförsvaret som kan påverka lungorna, huden, ögonen och/eller lymfkörtlarna• Hjärnan: inflammation som kan orsaka förvirring, feber, problem med minnet eller krampanfall
Infusionsreaktioner	<ul style="list-style-type: none">• Andnöd• Klåda eller utslag• Yrsel• Feber

Komplikationer, inklusive graft-versus-host-disease (GVHD), hos personer med transplanterad benmärg (stamceller) där donerade (allogena) stamceller används. Dessa komplikationer kan vara allvarliga och leda till döden. De kan uppstå om du tidigare genomgått denna typ av transplantation eller om du genomgår en i framtiden. Din läkare kommer att övervaka dig för tecken och symptom som kan innefatta hudutslag, inflammation i levern, buksmärta eller diarré.

Om du får några biverkningar, inklusive eventuella biverkningar som inte nämns här, kontakta din läkare.

Var uppmärksam på biverkningar

Det är viktigt att vara medveten om symtomen

Om du märker några symtom vid behandling med pembrolizumab, tala omedelbart med din läkare.

Vissa läkemedel, såsom kortikosteroider, kan ges för att förhindra allvarigare komplikationer och för att lindra symtomen. Din läkare kan behöva senarelägga eller avbryta din behandling om biverkningarna är för allvarliga.

Du uppmanas att inte försöka diagnostisera eller behandla biverkningar eller symtom på egen hand.

Vad ska man göra om symtom uppstår när du är hemifrån

Det är viktigt att du kontaktar din läkare närhelst symtom uppträder. **Bär alltid med dig ditt patientkort för pembrolizumab** med din behandlande läkares kontaktuppgifter, så att han/hon kan nås vid nödfall. Patientkortet innehåller viktig information om symtom som kräver omedelbar rapportering till den läkare eller sjukvårdspersonal som du kan möta på andra vårdinrättningar. Det uppmärksammar även andra läkare om att du behandlas med pembrolizumab.

**Bär alltid med dig
ditt patientkort för
pembrolizumab.**

Missa inte ditt sjukhusbesök för behandling med pembrolizumab

Om du slutar eller avbryter behandlingen kan det innebära att läkemedlets tumörhämmande effekt upphör. Avsluta inte behandlingen med pembrolizumab om du inte har diskuterat det med din läkare.

Gör ditt bästa för att gå på alla läkarbesök och boka omedelbart ny tid om du missar ett besök. **Kontakta omedelbart din läkare om du upplever biverkningar, även sådana som inte finns nämnda i denna broschyr.**

Din tumör kan först öka i storlek eller nya tumörer kan uppträda innan behandling med pembrolizumab visar positiv effekt. Det är viktigt att du behandlas med pembrolizumab så som det förskrivits för att få bästa möjliga effekt av din behandling.

Kontakta din läkare om du har några frågor om pembrolizumab eller om hur läkemedlet fungerar.

Kom ihåg

Pembrolizumab är en behandling som verkar genom att hjälpa ditt immunförsvar att bekämpa cancer. Denna typ av behandling kan ibland orsaka biverkningar.

Pembrolizumab ges genom infusion i en ven under 30 minuter, vanligtvis var 3:e vecka.

Med pembrolizumab kan vissa biverkningar uppstå som kan vara allvarliga.

Kontakta omedelbart din läkare om du upplever någon biverkning.

Tala med din läkare om du har några frågor om pembrolizumab eller om hur läkemedlet fungerar.



Copyright © 2015 Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA. All rights reserved.