

Laskimonsisäisiä rautavalmisteita käytetään raudanpuutostilan hoidossa, kun suun kautta otettavat valmisteet ovat tehottomia tai niitä ei voida käyttää.

Laskimonsisäiset rautavalmisteet voivat aiheuttaa allergisia reaktioita. Tämän vuoksi niitä saa antaa ainoastaan koulutettu henkilökunta, joka pystyy arvioimaan ja hoitamaan tällaisia reaktioita.

Joillakin potilailla nämä allergiset reaktiot voivat olla vakavia tai hengenvaarallisia (tunnetaan anafylaktisina reaktioina) ja voivat aiheuttaa sydän- ja verenpainevaivoja ja/tai pyörtymisen tai tajunnan menetyksen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä esitteessä. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan: [www-sivusto: www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

Laskimonsisäinen rauta

**Tärkeää tietoa potilaille
laskimonsisäisen raudan (lääke,
jota annetaan neulalla laskimon
sisään) mahdollisesta vakavien
allergisten reaktioiden riskistä**

Euroopan laskimonsisäisen raudan valmistajat ovat laatineet ja tuottaneet tämän tiedon.

Lue tämä esite huolellisesti. Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin puoleen.

Sinulla voi olla suurentunut riski saada allerginen reaktio, jos sinulla on:

- jokin todettu allergia, mukaan lukien lääkeaineallergia
- aiemmin todettu vaikea astma, ihottuma tai muita allergioita (esim. pöly- ja siitepölyallergia, allergia eläinten hilseelle) tai
- immuuni- tai tulehdussairauksia (kuten nivelreuma, punahukka ja muut)

Kerro lääkärillesi, jos sinulla on jokin näistä allergioista tai tiloista, **ennen kuin sinulle määrätään tai annetaan laskimonsisäistä rautavalmistetta**. Lääkäri päättää, ylittävätkö hoidon hyödyt siihen mahdollisesti liittyvät riskit.

Sinulle ei saa antaa laskimonsisäistä rautavalmistetta, jos:

- olet allerginen (yliherkkä) valmisteelle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle
- olet joskus saanut vakavan allergisen (yliherkkyys)reaktion rautavalmisteista, jotka annostellaan injektiona*
- sinulla on rautaylikuormitus (liikaa rautaa elimistössä)
- sinulla on anemia, joka ei johdu raudan puutteesta

Kerro lääkärillesi, jos sinulla on jokin näistä allergioista tai tiloista, **ennen kuin sinulle määrätään/annetaan laskimonsisäistä rautavalmistetta**.

*** On tärkeää tietää, että reaktio voi ilmetä, vaikka sinulla ei olisi ollut ongelmia laskimonsisäisen raudan kanssa aiemmin.**

Raskaus: laskimonsisäisiä

rautavalmisteita ei pidä käyttää raskauden aikana ellei tämä ole ehdottomasti välttämätöntä. Jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana, on tärkeää, että keskustelet lääkärin kanssa.

Ota heti yhteyttä lääkäriin tai sairaanhoitajaan, jos:

- sinulla ilmenee allergisen reaktion merkkejä tai oireita laskimonsisäisen raudan antamisen aikana tai pian hoidon jälkeen

Esimerkiksi: nokkosihottuma tai ihottuma, kutina, huimaus, pyörrytys, huulten, kielen, nielun tai kehon turpoaminen, hengitysvaikeudet, hengenahdistus tai hengityksen vinkuminen

- Lääkäri tai sairaanhoitaja tarkkailee vointiasi allergisten reaktioiden merkkien ja oireiden varalta vähintään 30 minuutin ajan aina laskimonsisäisen raudan antamisen jälkeen.