

Miten välttää sekaannus

Jos olet sokea tai sinulla on heikko näkö etkä pysty lukemaan kynän annoslaskurin lukemaa, älä käytä tätä kynää ilman apua. Pyydä apua henkilöltä, jolla on hyvä näkö ja joka on saanut opastuksen Tresiba®-valmisteen käyttöön.

Tarkista aina insuliinin nimilippu, kun saat valmisteen apteekissa ja ennen jokaista pistosta, jotta Tresiba®-valmisteen kaksi eri vahvuutta tai muut mahdollisesti käyttämäsi insuliinivalmisteet eivät menisi vahingossa sekaisin.

Jos käytät väärää insuliinivahvuutta tai -valmistetta, voit saada insuliinia liikaa tai liian vähän. Liian suuri insuliiniannos voi johtaa hypoglykemiaan eli alhaiseen verensokeriin. Voit pyytää hoitavalta lääkäriltäsi lisätietoja.

Tresiba®-valmisteen haittavaikutuksista tai lääkitysvirheistä on ilmoitettava Novo Nordisk Farma Oy:lle: novoinfo@novonordisk.fi tai 0800 122566 tai paikalliselle viranomaiselle: www-sivusto: www.fimea.fi; Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, FI-00034 Fimea.

Käytä tätä lääkettä aina tarkasti lääkärin ohjeiden mukaan. Noudata pakkausselosteessa annettuja ohjeita. Jos tarvitset apua, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai diabeteshoitajan puoleen.

Kenen ei tule käyttää Tresiba®-valmistetta

- Katso vasta-aiheet pakkausselosteesta

FlexTouch® ja Tresiba® ovat Novo Nordisk A/S:n (Tanska) omistamia tavaramerkkejä.

© Novo Nordisk A/S, Novo Álle, DK-2880 Bagsværd, Denmark

G22/hyväksymispäivä: [kuukausi, vuosi]



Tresiba®-insuliini

(degludekinsuliini-injektioneste

[degludekinsuliini tuotettu yhdistelmä-DNA-tekniikalla])

**Varmista, että käytät
lääkärin sinulle määräämää
insuliinivalmisteen vahvuutta**



Mitä Tresiba® on ja mihin sitä käytetään

Tresiba® on kerran päivässä käytettävä perusinsuliinianalogi. Tresiba®-insuliinia käytetään diabetes mellituksen hoitoon aikuisille. Se auttaa elimistöä alentamaan verensokeritasoa. Tresiba® annostellaan kerran vuorokaudessa. Tilanteissa, joissa et voi ottaa insuliinia normaalin annostusaikataulun mukaisesti, voit muuttaa annostuksen ajankohtaa. Varmista aina, että pistosten välinen aika on vähintään 8 tuntia.

Tresiba® -insuliinin kaksi vahvuutta

Tresiba®-insuliinia on saatavilla kahta eri vahvuutta: 100 yksikköä/ml ja 200 yksikköä/ml. Tresiba® 200 yksikköä/ml FlexTouch® -kynässä on kaksinkertainen määrä insuliiniyksiköitä millilitraa kohden. Lääkäri määrää sinulle sopivan vahvuuden.

Molemmissa kynissä on annoslaskuri-ikkuna, josta näet tarkkaan kuinka monta yksikköä olet valinnut annokseksi. Toisin sanoen annoslaskuri-ikkunassa näkyy pistettävä yksikkömäärä, riippumatta siitä, kumpi vahvuus on kyseessä. Valitse annos aina annoslaskurin avulla. Älä valitse annosta kynän naksahduksia laskemalla. Annosta ei pidä muuntaa, jos siirryt käyttämään eri vahvuista valmistetta. Tarkista, kuinka monta yksikköä valitsit, ennen kuin pistät Tresiba®-insuliinia.

Tresiba®
vahvuus 100 yksikköä/ml
enintään 80 yksikön annos/injektio



3 ml sisältää 300 yksikköä

Tresiba®
vahvuus 200 yksikköä/ml
enintään 160 yksikön annos/injektio



3 ml sisältää 600 yksikköä

Miten tunnistat sinulle määrätyn valmisteen vahvuuden


On tärkeää varmistaa, että käytät lääkärin sinulle määräämää oikeaa vahvuutta. Kynän nimilipussa ja pakkauskotelossa lukee selvästi "Tresiba® 100 yksikköä/ml" tai "Tresiba® 200 yksikköä/ml".

Lisäksi Tresiba® 100 yksikköä/ml -valmisteen pakkauskotelo ja nimilippu ovat vaaleanvihreitä, kun taas Tresiba® 200 yksikköä/ml -valmisteen pakkauskotelo ja nimilippu ovat tummanvihreitä ja niissä on raitoja. Tresiba® 200 yksikköä/ml -valmisteen nimilipussa ja pakkauskotelossa on myös punainen laatikko korostamassa valmisteen vahvuutta.


Tresiba® 100 yksikköä/ml -pakkaus,
jossa 5 kynää kotelossa



Tresiba® 200 yksikköä/ml -pakkaus
jossa 3 kynää kotelossa



Jos olet värisokea, tunnistat Tresiba® 200 yksikköä/ml -kynän annospainikkeeseen lisätyistä kahdesta koholla olevasta pisteestä.



Tresiba®
100 yksikköä/ml



Tresiba®
200 yksikköä/ml