

LEMTRADA® -behandling kan öka risken för:

Autoimmuna sjukdomar som:

- > En blödningsrubbnings som heter immun trombocytopeni (ITP)
- > Sällsynta njurproblem såsom antiglomerulär basalmembransjukdom [anti-GBM]]
- > Sköldkörtelrubbnings (hypo- eller hypertyreos)

Allvarliga infektioner

Läkare: Se LEMTRADA® produktresumén för mer information.

		MS-sjuksköterska
		Husläkare
		Neurolog
Telefonnummer	Namn	
Patientens namnteckning: _____		
Patientens namn: _____		

Neurologen som forskriver LEMTRADA® till dig kan nås på nedanstående nummer. Övriga läkare eller vårdpersonal som är involverade i min vård kan också finnas angivna.

Om några medicinska undersökningar genomförs, vänligen skicka kopior på samtliga journaler, inklusive eventuella behandlingar och/eller provsvar, till läkaren(-arna) på nedanstående lista.

LEMTRADA®

Patientvarningskort

Ha alltid detta kort med dig och visa det för all akut-, hälso- och sjukvårdspersonal för att informera dem om din behandling med LEMTRADA®.

Jag har behandlats med LEMTRADA®, en behandling för multipel skleros (MS), som påverkar immunförsvaret. Jag deltar i ett uppföljningsprogram som fortsätter varje månad i 4 år efter min sista behandling.

Viktiga biverkningar som du ska observera:

Kontakta din neurolog omedelbart för att rapportera dessa symtom oavsett om de är nya, har förvärrats eller är återkommande. Om du inte kan komma i kontakt med läkare, sök omedelbart vård hos en annan läkare eller läkarstation/hälsocentral. Visa läkaren det här kortet!

Immun trombocytopeni (ITP)

- > Små, spridda prickar på huden som är röda, rosa eller lila
- > Att man lätt får blåmärken
- > Blödningar från sår som är svårare att stoppa än normalt
- > Kraftigare, mer långvariga eller frekventa mensblödningar än normalt
- > Blödningar mellan menstruationerna eller rikligare blödningar än normalt
- > Blödning från tandkött eller näsa som har uppstått nyligen eller tar längre tid att stoppa än normalt
- > Blodiga upphostningar (kan även vara tecken på njursjukdom)

Njursjukdom

- > Blod i urinen, urinen kan vara röd eller tefärgad
- > Svullnad i benen eller fötterna

Allvarliga infektioner

- > Feber och/eller frossa
- > Svullna körtlar
- > Andnöd, hosta, väsande andning, smärta eller tryck i bröstet och blodiga upphostningar

Biverkningar kan uppkomma lång tid efter att du har fått en behandlingskur med LEMTRADA®.

Det är mycket viktigt att du fortsätter att lämna dina prover varje månad (även om du mår bra).



Tidig upptäckt och diagnos ger dig bästa möjligheten till framgångsrik behandling.



Du måste även fortsätta att vara uppmärksam på tecken och symtom.



Detta gäller i 4 år efter din sista behandlingskur med LEMTRADA®.