

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus



**Uudet myönnetty eläinlääkkeiden myyntiluvat  
12.9.-12.12.2018**

<b>Myyntiluvan myöntämispvm</b>	<b>Kauppanimi</b>	<b>Vahvuus</b>	<b>Lääkemuoto</b>	<b>Vaikuttava aine</b>	<b>Kohde-eläinlaji</b>	<b>Indikaatio</b>
2.11.2018	EPRIVALAN VET	5 mg/ml	kertavaleluliuos	eprinomectinum	Nauta (lihanaudat ja lypsylehmät), lammas, vuohi	<p>Seuraavien eprinomectiinille herkkien loislajien aiheuttamien tartuntojen hoito:  Nauta: Maha- ja suolistonematodit: Ostertagia spp. (täysik, L4-toukkam), O. lyrata (täysik), O. ostertagi (täysik, L4-toukkam, lepotilassa L4-toukkam), Cooperia spp. (täysik, L4-toukkam, lepotilassa L4-toukkam), C. onchophora (täysik, L4-toukkam), C. punctata (täysik, L4-toukkam), C. surnabada (täysik, L4-toukkam), C. pectinata (täysik, L4-toukkam), Haemonchus placei (täysik, L4-toukkam), Trichostrongylus spp. (täysik, L4-toukkam), T. axei (täysik, L4-toukkam), T. colubriformis (täysik, L4-toukkam), Bunostomum phlebotomum (täysik, L4-toukkam), Nematodirus helvetianus (täysik, L4-toukkam), Oesophagostomum spp. (täysik), Oesophagostomum radiatum (täysik, L4-toukkam), Trichuris spp. (täysik). Keuhkomato: Dictyocaulus viviparus (täysik, L4-toukkam). Permut (parasitoivat muodot): Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum. Syyhy punkit: Chorioptes bovis, Sarcoptes scabiei var. bovis. Täit ja väiveet: Linognathus vituli, Damalinia bovis, Haematopinus eurytarnus, Solenoptes capillatus. Kärpäset: Haematobia irritans.</p> <p>Pitkäkestoinen vaikutus</p> <p>Ohjeiden mukaan käytetty valmiste estää myös seuraavien loislajien uusintatartunnat:  Enintään 28 vrk: Dictyocaulus viviparus, Ostertagia ostertagi, Oesophagostomum radiatum, Cooperia punctata, Cooperia surnabada, Cooperia onchopora. Enintään 14 vrk: Nematodirus helvetianus. Enintään 21 vrk: Trichostrongylus colubriformis, Trichostrongylus axei, Haemonchus placei. Eprivalan vet -valmisteesta saadaan parhaat hoitotulokset, kun sitä käytetään näiden loislajien epidemiologisen tilanteen mukaan osana sekä sisä- että ulkoloisten häätöhoito-ohjelmaa. Lammas: Maha- ja suolistonematodit (aikuiset): Teladorsagia circumcincta (pinnata/trifurcata) Haemonchus contortus, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Nematodirus battus, Cooperia curticei, Chabertia ovina, Oesophagostomum venulosum. Keuhkomato (aikuiset): Dictyocaulus filaria.</p> <p>Vuohi: Maha- ja suolistonematodit (aikuiset): Teladorsagia circumcincta (pinnata/trifurcata), Haemonchus contortus, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Nematodirus battus, Cooperia curticei, Oesophagostomum venulosum. Keuhkomato (aikuiset): Dictyocaulus filaria.</p>
2.11.2018	ALTRESYN	4 mg/ml	oraaliliuos	altrenogestum	Sika	Kiiman synkronointiin sukukypsille ensikoille.

14.11.2018	METROBACTIN VET	250 mg, 500 mg	tabletti	metronidazolium	Koira ja kissa	Giardia spp:n ja Clostridia spp:n (ts. C. perfringens tai C. difficile) aiheuttamien maha-suolikanavan infektioiden hoito. Metronidatsolille herkkien obligatorisesti anaerobisten bakteerien (esim. Clostridia spp.) aiheuttamien urogenitaali-, suuontelo-, kurkku ja ihoinfektioiden hoito.
12.12.2018	SPIZOBACTIN VET	1500000 IU / 250 mg, 3000000 IU / 500 mg, 750000 IU /125 mg	purutabletti	spiramycinum, metronidazolium	Koira	Periodontaalisiin ja (peri)oraalisiin sairauksiin liittyvien usean bakteerilajin yhtäaikaaisesti aiheuttamien tulehdusten liittäishoito mekaanisen tai kirurgisen hoidon lisänä koiralla. Esimerkiksi gingiviitti, stomatiitti, glossiitti, periodontiitti, tonsilliitti, hammasfisteli ja muut fistelihaavat suuontelossa, keiliitti ja sinuiitti, joita aiheuttavat spiramysiinille/metronidatsolille herkät mikro-organismit, kuten Gram-positiiviset ja anaerobiset bakteerit (katso myös kohdat 4.4 ja 4.5).