



## TÄRKEÄÄ TIETOA POTILAALLE

Siirtyminen APIDRA<sup>®</sup>-insuliinin 3 ml:n sylinteriampulleista/esitäytetyistä APIDRA<sup>®</sup> SoloSTAR<sup>®</sup> -insuliinikynistä muihin pikainsuliinianalogeihin

**POTILAALLE – LUE TÄMÄ TIEDOTE HUOLELLISESTI  
ENNEN KUIN ALOITAT UUDEN INSULIININ KÄYTÖN**

### **APIDRA<sup>®</sup>-insuliinin 3 ml:n sylinteriampullien/ esitäytettyjen APIDRA<sup>®</sup> SoloSTAR<sup>®</sup>-insuliinikynien toimituksessa on tilapäisiä katkoja**

Kuten lääkäri tai muu terveydenhuoltohenkilöstö on ehkä jo kertonut, Sanofi ei valitettavasti pysty tällä hetkellä toimittamaan 3 ml:n APIDRA<sup>®</sup>-sylinteriampulleja ja esitäytettyjä APIDRA<sup>®</sup> SoloSTAR<sup>®</sup>-insuliinikyniä. Syynä on tuotanto-ongelma. Pyrimme siihen, että valmisteen saatavuus palautuu normaaliksi alkuvuodesta 2012.

### **Lääkärisi tai hoitajasi on päättänyt vaihtaa insuliinisi toiseen**

Käytössäsi olleita APIDRA<sup>®</sup>-sylinteriampulleja tai esitäytettyjä APIDRA<sup>®</sup> SoloSTAR<sup>®</sup>-insuliinikyniä ei valitettavasti pystytä tällä hetkellä toimittamaan. Näiden tilapäisten toimituskatkojen vuoksi lääkärisi on päättänyt vaihtaa APIDRA<sup>®</sup>-insuliinisi johonkin muuhun pikainsuliinianalogiin, esim. Humalog<sup>®</sup>- (lisproinsuliini) tai NovoRapid<sup>®</sup> (aspartinsuliini)<sup>1</sup>-insuliiniin.

### **Tärkeää tietoa ennen uuteen pikainsuliinianalogiin siirtymistä**

APIDRA<sup>®</sup>-insuliini ja toinen pikainsuliinianalogi ovat varsin samankaltaisia, mutta niiden vaikutuksessa verensokeriin saattaa silti olla eroja. On siis tärkeää, että keskustelet etukäteen lääkärin tai hoitajan kanssa siitä, miten uuteen insuliiniin siirtyminen saattaa vaikuttaa verensokeritasapainoosi. Ennen kuin otat ensimmäisen annoksen uutta pikainsuliinia, olisi hyvä keskustella lääkärisi tai hoitajasi kanssa siitä, että tarvitseeko annosta muuttaa.

Lue myös uuden pikainsuliinianalogin pakkausseloste kokonaan ennen kuin aloitat kyseisen insuliinin käytön.

On hyvin tärkeää, että seuraat verensokeriarvojesi säännöllisesti ja tiheästi etenkin ensimmäisten viikkojen aikana, jotta verensokeritasapaino pysyy hyvänä insuliinin vaihdon jälkeenkin ja annosta pystytään muuttamaan tarpeen mukaan.

**Ota heti yhteys lääkäriin tai hoitajaan, jos insuliinin vaihdossa on ongelmia tai olet huonovointinen. Jos ongelma on vakava (esim. verensokeritasapaino huononee tuntuvasti) tai kyseessä on henkeä uhkaava hätätilanne, ota yhteys alueesi päivystykseen.**

Ota yhteys lääkäriin tai muuhun terveydenhuoltohenkilöstöön, jos sinulla on kysyttävää sinulle määrätystä uudesta insuliinista.

### **Milloin 3 ml:n APIDRA<sup>®</sup>-sylinteriampullit ja esitäytetyt APIDRA<sup>®</sup> SoloSTAR<sup>®</sup>-insuliinikynät tulevat jälleen saataville?**

Pyrimme palauttamaan 3 ml:n APIDRA<sup>®</sup>-sylinteriampullien ja esitäytettyjen APIDRA<sup>®</sup> SoloSTAR<sup>®</sup>-insuliinikynien saatavuuden normaaliksi mahdollisimman pian. Ilmoitamme tällöin asiasta kaikille terveydenhuoltohenkilöstöön kuuluville, myös omalle lääkärillesi.

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat lisätietoa, voit ottaa yhteyttä Sanofin lääketieteelliseen neuvontaan puh: 0800 123 777 (valinta 1 potilaat; 3 terveydenhuollon ammattilaiset)