

TIEDOTE 10.9.2012

Intervet Oy
PL 86, Keilaranta 3
02151 ESPOO
Finland
T +358 (0)10 2310 750
F +358 (0)9 4127 235
info_ah_finland@merck.com
www.msd-animal-health.fi

Scalibor-pannan ja koiran vakavan sairastumisen yhteys epätodennäköinen



Sosiaalisessa mediassa ja lehdistössä käsiteltiin heinäkuussa 2012 koiratapausta, jossa Scalibor-pannan käyttäneellä 10-kuukauden ikäisellä koiralla oli todettu ripuli- ja oksenteluoireita sekä moniniveltulehdus. Koiran vointi oli hoidosta huolimatta heikentynyt ja koira lopetettiin 8.7.2012.

Scaliborin vaikuttava aine on pyrethroideihin kuuluva deltametriini. Tapaus raportoitiin vakavana haittavaikutusepäilynä MSD Animal Healthin kansainväliseen lääketurvayksikköön, josta se toimitettiin Euroopan lääkeviraston haittavaikutusjärjestelmän kautta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) tietoon. Koira lähetettiin ruumiinavaukseen. Tapauksen syy-yhteyden arviointi on nyt viety päätökseen.

Koiran sairauskertomuksen ja ruumiinavauslöydösten perusteella tehdyssä arvioinnissaan Fimea totesi, että koiralla esiintyneet oksentelu- ja ripulioireet ovat pyrethroideja sisältävien eläinlääkevalmisteiden tunnettuja haittavaikutuksia. Koska oksentelu uusiutui usean päivän kuluttua pinnan poistamisen jälkeen, on epätodennäköistä, että oire tässä tapauksessa liittyy pinnan käyttöön. Koiralla koko sairausepisodin ajan esiintynyt kuume ei ole pyrethroidien käyttöön liittyvä odotettu haittavaikutus vaan todennäköisesti tulehduselliseen sairauteen liittyvä oire. Ruumiinavauksessa koiralla todettiin oikean reiden lihaksistossa märkäinen tulehduspesäke, bakteerin aiheuttama moniniveltulehdus sekä bakteerin aiheuttama verenmyrkytys. Yhteenvetona Fimea totesi, että Scalibor-pannan käytön ja koiran vakavien, lopetukseen johtaneiden oireiden välinen yhteys on epätodennäköinen.

Scalibor on puutiaistartunnan ennaltaehkäisyyn ja hietasääskien sekä *Culex pipiens pipiens*-hyttysten verenimemisen ehkäisyyn tarkoitettu eläinlääkevalmiste. Haittavaikutukset Scalibor-pannan käytön yhteydessä ovat harvinaisia. Todetuista haittavaikutuksista tavallisimpia ovat ihovauriot pinnan kiinnityskohdassa, kuten paikallinen ihotulehdus, paikallinen ihon punoitus, kutina ja karvanlähtö. Erittäin harvinaisina haittavaikutuksina on todettu hermosto-oireita kuten vapinaa ja uneliaisuutta tai ruuansulatuskanavaan liittyviä oireita kuten oksentelua ja ripulia. Koska vaikuttavalle aineelle ei ole vastalääkettä, haittavaikutusten hoito on oireenmukaista. Jos oireita ilmenee, tulee panta poistaa ja koira pestä. Oireet helpottavat yleensä 48 tunnin kuluttua pinnan poistamisesta.

Lisätietoja:

Martina Reims, toimitusjohtaja,
050 4483 383, martina.reims@merck.com

Seppo Saari, eläinlääkäri,
050 4483 381, seppo.saari@merck.com

www.msd-animal-health.fi
www.scalibor.fi

Pienille ja keskikokoisille koirille: **Scalibor®vet 0.760 g panta (48 cm), sisältää deltametriiniä 0,760 g.**

Suurikokoisille koirille: **Scalibor®vet 1.000 g panta (65 cm), sisältää deltametriiniä 1,000 g.**

Kohde-eläinlaji: Koira **Käyttö:** Punkkitartunnan (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) torjunta 5-6 kuukauden ajan. Estää hietasääskiä (*Phlebotomus perniciosus*) imemästä verta 5-6 kuukauden ajan. Estää aikuisia hyttysiä (*Culex pipiens pipiens*) imemästä verta 6 kuukauden ajan. Yksi panta koiraan kohti. Ainoastaan ulkoiseen käyttöön. Scalibor-punkkipanta asetetaan koiran kaulan ympärille niin, että pinnan ja kaulan väliin tulisi mahtua kaksi sormea vierekkäin. Pinnan kireys tulee tarkistaa säännöllisesti. Panta saavuttaa täyden tehonsa viikon kuluttua. **Vasta-aiheet:** Ei saa käyttää alle 7 viikon ikäisille pennuille eikä koirilla, joilla on ihovaurioita tai eläimille, joiden tiedetään olevan yliherkkiä pyrethroideille (esim. kissat). **Haittavaikutukset:** Harvinaisissa tapauksissa voidaan havaita paikallisia ihovaurioita, ihotulehdusta tai ihon punoitusta, kutinaa ja karvanlähtöä. Erittäin harvoin on raportoitu neurologisia oireita kuten vapinaa ja letargiaa. Jos näitä oireita ilmenee, tulisi panta poistaa. Nämä oireet häviävät yleensä 48 tunnin kuluessa. Spesifistä vasta-ainetta ei tunneta, joten hoito on oireenmukaista. **Varoimet:** Panta on irrotettava ennen koiran päästämistä uimaan. Ei saa käyttää muiden organofosfaatteja sisältävien ulkolääkkeiden kanssa. Pinnan asettamisen jälkeen kädet on pestävä saippualla ja kylmällä vedellä. Älä käytä tätä tuotetta, jos olet allerginen trifenyylifosfaatille. Älä anna lasten, varsinkin alle 2-vuotiaiden, käsitellä pantaa tai laittaa sitä suuhun. **Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen ennen pinnan asettamista.**