

## Tietoa potilaille:

- Joillakin Trobalt®-epilepsialääkettä pitkäaikaisesti käyttäneillä potilailla on havaittu muutoksia silmän verkkokalvossa (silmänpohjan valoa aistiva kerros silmän takaosassa). Koska tämä saattaa johtaa muutoksiin näkökyvyssä, Trobalt®-lääkitystä tulisi käyttää ainoastaan, mikäli muut epilepsialääkkeet eivät tule kysymykseen.
- Älä lopeta oma-aloitteisesti lääkitystäsi, vaan keskustele vaihtoehtoista lääkärisi kanssa. Epilepsialääkkeen lopettaminen voi altistaa epilepsiakohtauksille.
- Mikäli käytät Trobalt®-lääkitystä, saattaa lääkärisi seuraavalla vastaanottokäynnillä vaihtaa lääkityksen toiseksi.
- Trobalt®-lääkityksen käyttö edellyttää silmien tutkimista puolivuositain. Keskustele tästä lääkärisi kanssa. Kerro myös lääkärillesi, mikäli havaitset näkökyvyssäsi muutoksia.
- Mikäli silmien verkkokalvolla tai näkökyvyssä havaitaan muutoksia, on lääkärisi arvioitava epilepsialääkityksesi uudelleen.
- Joillekin Trobalt®-lääkettä käyttäneellä potilaalla on tullut kynsien, huulten tai ihon siniharmaata värjäytymistä. Jos huomaat itselläsi tällaisia muutoksia, kerro niistä lääkärillesi.
- Halutessasi lisätietoa, keskustele lääkärisi kanssa.