

Hyvä eläinlääkäri

**Baytril vet 50 mg/ml injektioneste, liuos 100 ml**  
**Baytril vet 100 mg/ml injektioneste, liuos 50 ml**  
**Baytril vet 100 mg/ml injektioneste, liuos 100 ml**

Baytril vet injektioiden valmisteyhteenvedon tiedot ovat muuttuneet. Uudet valmisteyhteenvedot ovat osoitteessa [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi).

Huomatkaa erityisesti muuttuneet varoajat ja annosteluohjeet.

Muutoksia annostus ja antotapa -kohtaan:

Naudalla, lampaalla ja vuohella annos on 5 mg/kg kerran päivässä. Naudalla annostelu on mahdollista laskimonsisäisesti tai ihonalaisesti. Lampaalla ja vuohella ainoastaan ihonalaisesti.

Sialla indikaatiosta riippuen annos on 2,5 mg/kg kerran päivässä tai 5 mg/kg kerran päivässä. Annostelu aina lihaksensisäisesti.

Koiralla ja kissalla annos on 5 mg/kg kerran päivässä. Annostelu aina ihonalaisesti.

Muutoksia varoaikoihin:

Baytril vet 100 mg/ml:

Nauta: Suonensisäisen annostelun jälkeen: Teurastus 5 vrk, maito 3 vrk.

Ihonalaisen annostelun jälkeen: Teurastus 12 vrk, maito 4 vrk.

Lammas: Teurastus 4 vrk, maito 3 vrk.

Vuohi: Teurastus 6 vrk, maito 4 vrk.

Sika: Teurastus 13 vrk.

Baytril vet 50 mg/ml:

Vasikka: Suonensisäisen annostelun jälkeen: Teurastus 5 vrk.

Ihonalaisen annostelun jälkeen: Teurastus 12 vrk.

Ei saa käyttää lehmillä, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi.

Lammas: Teurastus 4 vrk, maito 3 vrk.

Vuohi: Teurastus 6 vrk, maito 4 vrk.

Sika: Teurastus 13 vrk.

Valmisteen uudet varoajat astuvat voimaan 18.05.2015.

Uusilla varoajoilla varustetut pakkaukset tulevat myyntiin 24.04.2016 mennessä.

Ystävällisin terveisin

ELL Markko Lehtosalo  
markkinointipäällikkö, tuotantoeläimet  
Puh. 010 426 2501  
[markko.lehtosalo@orionpharma.com](mailto:markko.lehtosalo@orionpharma.com)

ORION PHARMA ELÄINLÄÄKKEET

Bästa veterinär,

Baytril vet 50 mg/ml injektionsvätska, lösning 100 ml  
Baytril vet 100 mg/ml injektionsvätska, lösning 50 ml  
Baytril vet 100 mg/ml injektionsvätska, lösning 100 ml

Informationen i produktresumén för Baytril vet injektioner har ändrats.  
De nya produktresuméerna finns på [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi).

Observera särskilt de ändrade karenstiderna och doseringsanvisningarna.

Ändringar i avsnittet Dos och administreringssätt:

Hos nöt, får och get är dosen 5 mg/kg en gång dagligen. Hos nöt kan administreringen ske intravenöst eller subkutant. Hos får och get endast subkutant.  
Hos svin administreras läkemedlet enligt indikation och dosen är 2,5 mg/kg en gång dagligen eller 5 mg/kg en gång dagligen. Administreringen ska alltid ske intramuskulärt.  
Hos hund och katt är dosen 5 mg/kg en gång dagligen. Administreringen ska alltid ske subkutant.

Ändringar i karenstiderna:

Baytril vet 100 mg/ml:

Nöt: Efter intravenös administrering: Slakt 5 dygn, mjölk 3 dygn.

Efter subkutan administrering: Slakt 12 dygn, mjölk 4 dygn.

Får: Slakt 4 dygn, mjölk 3 dygn.

Get: Slakt 6 dygn, mjölk 4 dygn.

Svin: Slakt 13 dygn.

Baytril vet 50 mg/ml:

Kalv: Efter intravenös administrering: Kött och slaktbiprodukter 5 dagar.

Efter subkutan administrering: Kött och slaktbiprodukter 12 dagar.

Ska inte användas till nöt som producerar mjölk till livsmedel.

Får: Slakt 4 dygn, mjölk 3 dygn.

Get: Slakt 6 dygn, mjölk 4 dygn.

Svin: Slakt 13 dygn.

Nya karenstider träder i kraft den 18.05.2015.

Förpackningar med de nya karenstiderna kommer ut till försäljning före 24.04.2016.

Med vänlig hälsning

VML Markko Lehtosalo  
marknadschef, produktionsdjur  
Tfn 010 426 2501  
[markko.lehtosalo@orionpharma.com](mailto:markko.lehtosalo@orionpharma.com)

ORION PHARMA ELÄINLÄÄKKEET