

OPDIVO[®]

(nivolumab)

Patientkort

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. På detta sätt kan man snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera alla de biverkningar du eventuellt får. Om du får biverkningar, tala med din läkare.



Bristol-Myers Squibb

OPDIVO® (nivolumab)

Detta kort innehåller viktig information.

Bär alltid med dig detta kort för att kunna informera sjukvårdspersonal att du får behandling med nivolumab eller nivolumab i kombination med ipilimumab.

Kontakta din läkare omedelbart om du upplever något av dessa eller några andra symtom

LUNGOR¹

Andningssvårigheter, hosta

MAGE OCH TARM¹

Diarré (vattnig, mjuk eller lös avföring), blod eller slem i avföringen, mörkfärgad avföring, smärta eller ömhet i mage eller buk

LEVER¹

Gulfärgade ögon eller hud (gulshot), smärta på höger sida av magtrakten, trötthet

NJURAR¹

Minskad urinnängd

DIABETES/DIABETISK KETOACIDOS¹

Överdriven törst, ökad aptit med viktförlust, trötthet, svaghet, dåsighet, depression, irritation, allmän sjukdomskänsla, ökad urinnängd

HUD¹

Hudreaktioner som hudutslag med eller utan klåda, blåsor och/eller hudfjällning (ibland dödlig), sår, torr hud, hudknutor

HORMONPRODUCERANDE KÖRTLAR¹

Huvudvärk, dimsyn eller dubbelseende, utmattning (extrem trötthet), viktförändring, beteendeförändringar (t.ex minskad sexlust, irritation eller glömska)

HJÄRTA¹

Bröstmärta, oregelbunden hjärtrytm, hjärtklappning

MUSKLER¹

Muskelsmärta, stelhet, svaghet, förvirring, minskad urinnängd, mörk urin, uttalad trötthet

ÖVRIGT¹

Smärta eller rodnad i ögat, dimsyn eller andra synproblem; smärta i övre delen av buken, minskad aptit, illamående eller kräkning; matsmältningsbesvär eller halsbränna; stickningar eller domningar i armar och ben eller svårigheter att gå; feber, svullna lymfkörtlar; tecken eller symtom på inflammation i hjärnan, som kan inkludera huvudvärk, feber, krampanfall, nackstelhet, trötthet, förvirring, svaghet eller dåsighet

VIKTIGT:

- Tidig hantering av biverkningar, av din läkare, minskar sannolikheten för att behandlingen med nivolumab eller nivolumab i kombination med ipilimumab måste stoppas tillfälligt eller permanent.
- Symtom som tycks vara milda kan snabbt förvärras om de inte behandlas¹.
- Försök inte att behandla dessa symtom på egen hand.
- Rapportera dessa eller andra symtom till din läkare direkt.
- Tecken och symtom kan ibland uppträda sent det vill säga veckor eller månader efter sista dos¹.
- Bär alltid med dig detta kort för att kunna informera sjukvårdspersonal att du får behandling med nivolumab eller nivolumab i kombination med ipilimumab.

INNAN DU BÖRJAR BEHANDLING MED NIVOLUMAB, BERÄTTA FÖR DIN LÄKARE OM DU:

- Vet att du är allergisk mot nivolumab, något annat läkemedel eller beståndsdel i ett läkemedel.
- Har en autoimmun sjukdom.
- Har melanom i ögat.
- Har fått biverkningar vid behandling med et annat läkemedel till exempel med ipilimumab.
- Har fått veta att cancer har spridit sig till hjärnan.
- Har tagit läkemedel som dämpar ditt immunförsvar.
- Har transplanterats (nivolumab kan orsaka avstötning av transplanterade organ, till exempel njure, lever, hjärta, hornhinna eller hud).
- Har fått en benmärgs- eller stamcellstransplantation från en annan person (allogen, celltransplantation från en annan person).
- Tidigare har haft inflammation i lungorna.
- Är gravid, planerar att bli gravid eller ammar.
- Tar eller har tagit andra läkemedel.
- Står på en saltfattig kost.

För mer information se Opdivo bipacksedel eller ring Medicinsk Information på telnr: 09-25121244.

KONTAKTUPPGIFTER TILL MIN LÄKARE

Läkarens namn:

Telefonnummer arbete:

Telefonnummer efter kontorstid:

MINA KONTAKTUPPGIFTER

Mitt namn och telefonnummer:

Kontaktinformation vid en nödsituation:

VIKTIG INFORMATION FÖR SJUKVÅRDPERSONAL

- Denna patient behandlas med **nivolumab eller nivolumab i kombination med ipilimumab**.
- Immunrelaterade biverkningar kan uppträda när som helst under behandlingen eller månader efter avslutad behandling.
- Tidig diagnos och lämplig behandling är avgörande för att minimera livshotande komplikationer. En nivolumab-specifik hanteringsguide för immunrelaterade biverkningar finns tillgängligt.
- Att konsultera en specialist inom onkologi eller annan medicinsk specialist kan vara till hjälp vid hanteringen av organspecifika immunrelaterade biverkningar.

För mer information, vänligen se OPDIVO® produktresumé (SmPC) finns på www.ema.europa.eu eller ring Medicinsk Information på telnr: 09-25121244.

1. OPDIVO® bipacksedel



Bristol-Myers Squibb