

PENTHROX[®]

(metoksifluraani)

Checklista för administrering

Denna checklista är nödvändig för att säkerställa säker och effektiv användning av metoxifluran och lämplig hantering av viktiga utvalda risker.

VIKTIG INFORMATION FÖR RISKMINIMISERING FÖR VÅRDPERSONAL

Innan användning av metoxifluran kontrollera att patienten inte har:

- Kardiovaskulär instabilitet
- Överkänslighet mot metoxifluran (eller några fluorerade anestetika)
- Förhöjd kroppstemperatur av anestetika (malign hypertermi)
- Reducerad medvetandegrad (inklusive orsakad av alkohol)
- Nedsatt njurfunktion

Kontrollera också:

- Ålder under 18 år
- Andningsdepression
- Nedsatt leverfunktion
- Senaste administreringen av metoxifluran

Om patienten lider av några av ovan listade tillstånd eller tar några av läkemedlen listade på baksidan, ge **INTE** metoxifluran.

Instruera patienten hur man korrekt administrerar metoxifluran.

Påminnelse: Läs produktinformationen innan administrering och ge bipacksedeln till patienten. Säkerställ att lägsta nödvändiga dos administreras och att maxdosen 6 ml (2 x 3 ml flaskor) inte överskrids.

Patienten tar inte:

CYP 450 enzyminducerare (t.ex alkohol, isoniazid, fenobarbital eller rifampicin). Antibiotika med känd nefrotoxisk effekt (t.ex tetracyklin, gentamicin, kolistin, polymyxin B eller amfotericin B).

Samtidig användning av metoxifluran och CNS-depressiva medel kan framkalla additiva hämmande effekter och patienter bör observeras noggrant.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Fimea, www.fimea.fi.