

PENTHROX[®]

(metoksifluraani)

Tarkistuslista lääkkeen antamista varten

Tämä tarkistuslista sisältää tärkeää tietoa metoksifluraanin turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä sekä tärkeiden riskien asianmukaisesta hallinnasta.

TÄRKEÄÄ TIETOA RISKIEN MINIMOINNISTA TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE

Ennen kuin annat metoksifluraania, tarkista ettei seuraavat koske potilasta:

Sydän- ja verisuonivaivat

Yliherkkyys metoksifluraanille (tai mille tahansa muulle fluoripitoiselle anestesia-aineelle)

Kehon lämpötilan nousu jonkin anestesia-aineen saamisen jälkeen (maligni hypertermia)

Tajunnan tason aleneminen (myös alkoholin takia)

Munuaisten vajaatoiminta

Tarkista myös:

Alle 18 vuotias

Kehkojen vajaatoiminta tai hengityslama

Maksan vajaatoiminta

Edellinen metoksifluraanin anto

Jos potilaalla on mikä tahansa tässä luetelluista tiloista tai jos hän käyttää mitä tahansa kääntöpuolella luetelluista lääkeaineista, **ÄLÄ** anna metoksifluraania.

Neuvo potilasta, miten metoksifluraania otetaan oikein.

Muista: Lue valmisteyhteenveto ennen lääkkeen antamista ja anna potilaalle pakkausseloste. Varmista, että potilaalle annetaan pienin tarvittava annos ja ettei 6 ml:n enimmäisannosta (2 x 3 ml:n pulloa) ylitetä.

Potilas ei käytä:

CYP450 entsyymiä indusoivia aineita (esim. alkoholia, isoniatsidia, fenobarbitaalia tai rifampisiinia). Antibiootteja, joilla on tunnetusti munuaistoksisia vaikutuksia (esim. tetrasykliini, gentamisiini, kolistiini, polymyksiini B ja amfoterisiini B).

Metoksifluraanin samanaikainen käyttö keskushermostoa lamaavien lääkkeiden kanssa saattaa aiheuttaa additiivisia keskushermostoa lamaavia vaikutuksia, ja potilasta on seurattava tarkoin.

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla oidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveystieteiden tutkimuskeskuksen ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäilyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle: Fimea, www.fimea.fi.