

Potilaan muistutuskortti

Lääkärin nimi: _____

Puhelinnumero: _____

Isotretinoin Actavista ei saa käyttää raskauden aikana. Isotretinoin Actavis voi vahingoittaa syntymätöntä lasta vakavasti, mikäli raskaana oleva nainen käyttää lääkettä.

Jos tulet raskaaksi tai luulet olevasi raskaana, lopeta Isotretinoin Actaviksen käyttö välittömästi ja ota yhteys lääkäriin.

Lue pakkausseloste huolellisesti ennen hoidon aloittamista.

Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita Isotretinoin Actaviksen käytöstä, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

ratiopharm

TEVA

Group Member

Mitä sinun tulee tehdä, jos voit tulla raskaaksi:

◆ Sinun tulee käyttää vähintään yhtä (1) todella tehokasta ehkäisymenetelmää (kuten kohdun sisäistä laitetta tai implanttia) tai käyttää kahta (2) tehokasta ehkäisymenetelmää oikein, jotka toimivat eritavoin (kuten suun kautta otettava ehkäisyvalmistetta yhdessä kondomin kanssa) ennen hoitoa, hoidon aikana sekä yhden kuukauden ajan hoidon lopettamisen jälkeen.

◆ Sinä et saa tulla raskaaksi Isotretinoin Actavis -valmisteen käytön aikana tai yhteen kuukauteen hoidon lopettamisen jälkeen.

◆ Sinun tulee osallistua säännöllisiin seuranta-käynteihin ja raskaustesteihin:

- Ennen hoidon aloittamista sinun tulee tehdä raskaustesti, jonka tulee olla negatiivinen.
- Varmistaaksesi, että et ole raskaana hoidon aikana sinun tulee tehdä raskaustestejä, mieluiten kuukausittain. Sinun tulee myös tehdä viimeinen raskaustesti yksi kuukausi hoidon lopettamisen jälkeen.

Muistutus miehille ja naisille

Tämä lääke on määrätty ainoastaan sinulle, **älä anna sitä muille ja palauta mahdollisesti ylijääneet kapselit takaisin apteekkiin.**

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Päivitetty viimeksi: Syyskuu 2018 FI/GEN/18/0133/09/2018

Påminnelsekort för patienten

Läkarens namn: _____

Telefon: _____

Isotretinoin Actavis får inte tas under pågående graviditet.

Om en gravid kvinna tar Isotretinoin Actavis kan det allvarligt skada det ofödda barnet.

Om du blir gravid eller tror att du kan vara gravid, ska du omedelbart sluta ta Isotretinoin Actavis och kontakta läkare.

Läs bipacksedeln noga innan du påbörjar behandlingen.

Om du har några frågor om, eller är orolig över att ta Isotretinoin Actavis, tala med läkare eller apotekspersonal.

ratiopharm

TEVA

Group Member

Vad du bör göra om det finns en möjlighet att du skulle kunna bli gravid:

◆ Du måste använda åtminstone en (1) mycket effektiv preventivmetod (t.ex. intrauterint inlägg eller implantat) eller använda två (2) effektiva preventivmetoder som fungerar på olika sätt (t.ex. något preventivmedel som tas via munnen i kombination med kondom) på ett korrekt vis innan behandlingen inleds, under tiden du behandlas, och under 1 månad efter att du avslutat behandlingen.

◆ Du får inte bli gravid under den tid som du tar Isotretinoin Actavis, eller en period på 1 månad efter att du har avslutat behandlingen.

◆ Du måste gå på regelbundna uppföljningsbesök och måste göra regelbundna graviditetstester:

- Innan du påbörjar behandlingen måste du göra ett graviditetstest, som ska vara negativt.
- För att säkerställa att du inte är gravid under tiden du behandlas, kommer du att få göra upprepade graviditetstester, helst en gång i månaden. Du ska också göra graviditetstest 1 månad efter att du har avslutat behandlingen.

Påminnelse till män och kvinnor

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. **Ge det inte till någon annan och lämna in alla eventuellt överblivna kapslar till apoteket.**

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Senast uppdaterad: September 2018 FI/GEN/18/0133/09/2018