

## Potilaan muistutuskortti

Lääkärin nimi: \_\_\_\_\_

Puhelinnumero: \_\_\_\_\_

### Neotigasonia (asitreiini) ei saa käyttää raskauden aikana.

Neotigason (asitreiini) voi vahingoittaa syntymätöntä lasta vakavasti, mikäli raskaana oleva nainen käyttää lääkettä.

Jos tulet raskaaksi tai luulet olevasi raskaana, lopeta Neotigasonin (asitreiini) käyttö välittömästi ja ota yhteys lääkäriin.

Lue pakkausseloste huolellisesti ennen hoidon aloittamista.

**Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita Neotigasonin (asitreiini) käytöstä, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.**

ratiopharm

TEVA

Group Member

### Mitä sinun tulee tehdä, jos voit tulla raskaaksi:

- ◆ Sinun tulee käyttää vähintään yhtä (1) todella tehokasta ehkäisymenetelmää (kuten kohdun sisäistä laitetta tai implanttia) tai käyttää kahta (2) tehokasta ehkäisymenetelmää oikein jotka toimivat ertavoim (kuten suun kautta otettavaa ehkäisyvalmistetta yhdessä kondomin kanssa) ennen hoitoa, hoidon aikana sekä kolmen vuoden ajan hoidon lopettamisen jälkeen.
- ◆ Sinä et saa tulla raskaaksi Neotigason-valmisteen käytön aikana tai kolmeen vuoteen hoidon lopettamisen jälkeen.



Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

### ◆ Sinun tulee osallistua säännöllisiin seuranta-käynteihin ja raskaustesteihin:

- Ennen hoidon aloittamista sinun tulee tehdä raskaustesti, jonka tulee olla negatiivinen
- Varmistaaksesi, että et ole raskaana hoidon aikana sinun tulee tehdä raskaustestejä, mieluiten kuukausittain. Sinun tulee myös tehdä raskaustestejä 1-3 kuukauden välein kolmen vuoden ajan hoidon lopettamisen jälkeen.

### Muistutus miehille ja naisille

Tämä lääke on määrätty ainoastaan sinulle, **älä anna sitä muille ja palauta mahdollisesti ylijääneet kapselit takaisin apteekkiin.**

Päivitetty viimeksi: Syyskuu 2018 FI/GEN/18/0134/09/2018

## Påminnelsekort för patienten

Läkarens namn: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

### Neotigason (acitretin) får inte tas under pågående graviditet.

Om en gravid kvinna tar Neotigason (acitretin) kan det allvarligt skada det ofödda barnet.

Om du blir gravid eller tror att du kan vara gravid, ska du omedelbart sluta ta Neotigason (acitretin) och kontakta läkare.

Läs bipacksedeln noga innan du påbörjar behandlingen.

**Om du har några frågor om, eller är orolig över att ta Neotigason (acitretin), tala med läkare eller apotekspersonal.**

ratiopharm

TEVA

Group Member

### Vad du bör göra om det finns en möjlighet att du skulle kunna bli gravid:

- ◆ Du måste använda åtminstone en (1) mycket effektiv preventivmetod (t.ex. intrauterint inlägg eller implantat) eller använda två (2) effektiva preventivmetoder som fungerar på olika sätt (t.ex. något preventivmedel som tas via munnen i kombination med kondom) på ett korrekt vis innan behandlingen inleds, under tiden du behandlas, och i 3 års tid efter att du avslutat behandlingen.
- ◆ Du får inte bli gravid under den tid då du tar Neotigason, eller under en period på 3 år efter att du har avslutat behandlingen.



Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

### ◆ Du måste gå på regelbundna uppföljningsbesök och måste göra regelbundna graviditetstester:

- Innan du påbörjar behandlingen måste du göra ett graviditetstest, som ska vara negativt.
- För att säkerställa att du inte är gravid under tiden du behandlas, kommer du att få göra upprepade graviditetstester, helst en gång i månaden. Du ska också göra graviditetstester med 1 - 3 månaders mellanrum i en period på 3 år efter att du har avslutat behandlingen.

### Påminnelse till män och kvinnor

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. **Ge det inte till någon annan och lämna in alla eventuellt överblivna kapslar till apoteket.**

Senast uppdaterad: September 2018 FI/GEN/18/0134/09/2018