

# PATIENTKORT FÖR HYRIMOZ® (ADALIMUMAB)

Patientens namn: \_\_\_\_\_

Läkarens namn: \_\_\_\_\_

Läkarens telefonnummer: \_\_\_\_\_

Det här patientkortet innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till före, under och efter din behandling med Hyrimoz® (adalimumab). Du ska alltid visa det här kortet för alla läkare som är delaktiga i att behandla dig (oavsett vilken sjukdom det gäller). Läs bipacksedeln till Hyrimoz® noggrant innan du börjar ta den här medicinen.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Datum för din första Hyrimoz®-injektion: \_\_\_\_\_

Dos vid din första Hyrimoz®-injektion: \_\_\_\_\_

Datum för din sista Hyrimoz®-injektion  
(om du inte längre tar Hyrimoz®): \_\_\_\_\_

Övriga upplysningar: \_\_\_\_\_

Det är viktigt att du och din läkare antecknar namnet (t.ex. Hyrimoz®) och tillverknings-satsnumret på din medicin.

Be läkaren att anteckna typ och datum för senaste screening(ar) för tuberkulos (TBC) nedan:

Test: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Resultat: \_\_\_\_\_

Test: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Resultat: \_\_\_\_\_

Se till att du alltid har med dig en lista över alla andra mediciner som du använder när du träffar läkare, sköterska eller annan vårdpersonal. Ta även upp eventuella receptfria läkemedel eller naturläkemedel/alternativmedicin som du använder.

Ange nedan alla andra mediciner som du tar regelbundet:

\_\_\_\_\_

Ange eventuella allergier här:

\_\_\_\_\_

## Rapportering av biverkningar

Om du märker några biverkningar, kontakta läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i bipacksedeln. Du kan också rapportera biverkningarna direkt (se kontaktuppgifter nedan). Genom att rapportera biverkningarna kan du hjälpa till att få mer information om säkerheten för detta läkemedel.

Webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea  
Läkkeiden haittavaikutusrekisteri  
PL 55  
00034 FIMEA

Bär med dig det här kortet i 5 månader efter din sista dos Hyrimoz®, och vid graviditet i minst 6 månader efter att barnet föddes. Biverkningar kan uppstå långt efter den sista dosen.

## Infektioner

Innan du får behandling med Hyrimoz<sup>®</sup>:

- Tala om för läkaren om du har någon infektion, även om den är mycket lindrig.
- Det är mycket viktigt att du berättar för läkaren om du någon gång har haft TBC, eller om du har haft nära kontakt med någon som har TBC. Läkaren kommer att ta ett prov för att se om du har TBC. Be läkaren att anteckna typ och datum för senaste screening(ar) för TBC på kortet.

---

## Infektioner

Under behandlingen med Hyrimoz<sup>®</sup>:

- Tala omedelbart om för läkaren om du får några tecken eller symtom på infektion. Sådana tecken och symtom kan bland annat vara feber, trötthet, (ihållande) hosta, andfåddhet, viktnedgång, nattliga svettningar, diarré, sår som inte läker som de ska, problem med tänderna, en brännande känsla när du kissar eller "influensa-liknande" symtom.

---

## Cancer

Innan du får behandling med Hyrimoz<sup>®</sup>:

- Tala om för läkaren om du har eller har haft någon typ av cancer.

Under behandlingen med Hyrimoz<sup>®</sup>:

- Tala omedelbart om för läkaren om du får nattsvettningar, svullna lymfkörtlar på halsen, i armhålorna, ljumskarna eller på andra ställen, oförklarlig viktnedgång, nya hudlesioner eller förändringar i hudlesioner som du redan har (t.ex. födelsemärken eller fräknar), eller svår klåda någonstans på kroppen som inte har någon känd orsak.

---

## Problem med nervsystemet

Innan du får behandling med Hyrimoz<sup>®</sup>:

- Tala om för läkaren om du upplever några domningar eller stickningar i kroppen eller om du har problem som påverkar nervsystemet, till exempel multipel skleros.

Under behandlingen med Hyrimoz<sup>®</sup>:

- Tala omedelbart om för läkaren om du får domningar eller stickningar i händerna eller fötterna, eller om du upplever synförändringar, muskelsvaghet eller oförklarlig yrsel.

---

## Hjärtsvikt

Innan du får behandling med Hyrimoz<sup>®</sup>:

- Tala om för läkaren om du har några hjärtproblem, till exempel lindrig hjärtsvikt.

Under behandlingen med Hyrimoz<sup>®</sup>:

- Tala omedelbart om för läkaren om du märker av några tecken på hjärtproblem. Sådana tecken kan bland annat vara andfåddhet, svullna fötter, förändrad hjärtrytm eller plötslig viktuppgång.

---

## Graviditet och vaccinationer

- Om du har fått Hyrimoz<sup>®</sup> medan du var gravid är det viktigt att du informerar barnläkaren om det innan ditt barn får några vaccinationer.
- Barnet bör inte få något "levande vaccin" som BCG (mot TBC) inom 5 månader efter den sista injektionen med Hyrimoz<sup>®</sup> som du fick under graviditeten.