



Nimi

Syntymäaika

Pvm

1

Oletko todennut, että potilaallasi on riski saada anafylaktinen reaktio tai hän on jo saanut anafylaktisen reaktion?

KYLLÄ

2

Onko potilas perehtynyt siihen, milloin adrenaliini annetaan?

KYLLÄ ja EpiPen®/EpiPen® Jr. on jo käytössä

▶ Jatka KOHDASTA 3

KYLLÄ, mutta EpiPen®/EpiPen® Jr. ei ole käytössä

▶ Jatka KOHDASTA 2

EI

▶ Jatka KOHDASTA 1

**KOHTA 1:** Oletko kertonut potilaalle, miten toimia allergeenikontaktin yhteydessä ja milloin adrenaliini annetaan?

KYLLÄ

▶ Jatka KOHDASTA 2

**KOHTA 2:** Oletko näyttänyt potilaalle EpiPen®/EpiPen® Jr. -autoinjektorin ja opastanut sen käyttövaiheet sekä EpiPen®/EpiPen® Jr. -harjoituskynän että EpiPen®/EpiPen® Jr. -opetusvideon avulla? (Katso lisätietoja vastakkaiselta puolelta)

KYLLÄ

▶ Jatka KOHDASTA 3

**KOHTA 3:** Oletko pyytänyt potilasta näyttämään EpiPen®/EpiPen® Jr. -autoinjektorin käsittelyä EpiPen®/EpiPen® Jr. -harjoituskynän avulla?

KYLLÄ

3

Oletko suositellut, että potilaan kannattaa harjoitella pistämistä säännöllisesti ja kouluttaa lähipiiri pistoksen antoon?

KYLLÄ

4

Oletko suositellut, että potilaan kannattaa pitää aina mukana kaksi EpiPen®/EpiPen® Jr. -autoinjektoria siltä varalta, että oireet eivät helpota ja toinen annos on tarpeen?

KYLLÄ

5

Oletko kehottanut potilasta asettamaan itselleen muistutuksen EpiPen®/EpiPen® Jr. -autoinjektorin viimeisestä käyttöpäivämäärästä, jotta lääkityksen uusimiseen jää riittävästi aikaa?

KYLLÄ

