

Potilaan materiaalit

Acitretin

Potilaan muistutuskortti

Lääkärin nimi:	
Puhelinnumero:	

Acitretin Orifarm -valmistetta ei saa käyttää raskauden aikana.

Acitretin Orifarm voi aiheuttaa vakavaa haittaa sikiölle, jos odottava äiti käyttää sitä.

Jos tulet raskaaksi tai epäilet olevasi raskaana, lopeta Acitretin Orifarm -valmisteen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin.

Lue pakkausseloste huolellisesti ennen hoidon aloittamista.

Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita Acitretin Orifarm -valmisteen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Toimi näin, jos olet nainen, joka voi tulla raskaaksi:

- **Sinun on käytettävä vähintään yhtä erittäin tehokasta ehkäisymenetelmää (kuten ehkäisykierukkaa tai -implantaattia) tai kahta tehokasta eri tavoin toimivaa ehkäisymenetelmää (kuten ehkäisytabletteja ja lisänä kondomia) oikealla tavalla ennen hoitoa, hoidon aikana ja kolmen vuoden ajan hoidon päätyttyä.**
- **Et saa tulla raskaaksi** Acitretin Orifarm -valmisteen käytön aikana etkä kolmeen vuoteen hoidon päätyttyä.
- **Sinun on käytävä säännöllisesti seurantakäynneillä ja raskaustesteissä:**
 - Sinun on käytävä raskaustestissä ennen hoidon aloittamista, ja raskaustestin tuloksen on oltava negatiivinen.
 - Sinun on käytävä raskaustesteissä hoidon aikana (mieluiten kuukausittain), jotta hoidon aikainen raskaus voidaan sulkea pois. Sinun on käytävä raskaustestissä 1-3 kuukauden välein kolmen vuoden ajan hoidon päättymisestä.

Muistutus miehille ja naisille

Tämä lääke on määrätty vain sinulle.

Sitä ei saa antaa muiden käyttöön. Palauta käyttämättömät kapselit takaisin apteekkiin.