

Rådfråga omedelbart läkare som kan uppmäna dig att sluta ta Agomelatine Mylan.

- gul hud/gula ögon
- mörkare urin
- ljus avföring
- smärta i övre, högra delen av buken
- onormal trötthet (speciellt i samband med andra symtom som anges ovan).

Om du observerar något av följande är det möjligt att din lever inte fungerar ordentligt:

- Var uppmärksam på tecken på leverproblem förhöjda nivåer av leverenzymmer i blodet under behandlingen

**Kom ihåg att ha detta kort med dig på läkarbesök.**

Om läkaren ökar dosen till 50 mg behöver blodproven tas på nytt.

Blodprov	↑	↑	↑	↑	↑
Före start eller vid dosökning	Efter cirka 3 veckor	Efter cirka 6 veckor	Efter cirka 3 månader	Efter cirka 6 månader	Efter cirka 6 månader

När?

## TIDER FÖR BLODPROVTAGNING

### KOM IHÅG

Regelbundna blodprov är viktiga när du tar Agomelatine Mylan.

Följande tabeller hjälper dig att komma ihåg avtalade tider för blodprov.

Datum	
Agomelatine Mylan 25 mg – behandling startar	
Blodprov för leverenzymmer	
1:a blodprovet (vid behandlingsstart)	
2:a blodprovet (efter cirka 3 veckor)	
3:e blodprovet (efter cirka 6 veckor)	
4:e blodprovet (efter cirka 3 månader)	
5:e blodprovet (efter cirka 6 månader)	

Datum	
Dosökning till 50 mg	
Blodprov för leverenzymmer	
Blodprov när agomelatin 50 mg påbörjas	
2:a blodprovet (efter cirka 3 veckor)	
3:e blodprovet (efter cirka 6 veckor)	
4:e blodprovet (efter cirka 3 månader)	
5:e blodprovet (efter cirka 6 månader)	

Läkaren bestämmer om ytterligare prov behövs.

**Kom ihåg att ha detta kort med dig på läkarbesök.**

Detta material har utarbetats av Mylan

Läkaren kontrollerar med blodprov att din lever fungerar ordentligt innan behandlingen påbörjas. Resultaten berättar läkaren hur din lever fungerar och om Agomelatine Mylan passar dig. Under behandlingen med Agomelatine Mylan kan vissa patienter få förhöjda nivåer av leverenzymmer i blodet. Nivåer av dessa leverenzymmer visar om levern fungerar ordentligt och är ytterst viktiga i uppföljningen av din behandling.

### Varför?

- Gå regelbundet på blodprov

## För att undvika leverproblem under behandlingen

- Fråga din läkare om råd:
- om du har haft leverproblem
- om du har fetma eller övervikt
- om du har diabetes
- om du dricker alkohol
- om du tar andra läkemedel (som man vet påverkar levern)

- Det finns även andra orsaker varför Agomelatine Mylan eventuellt inte passar dig.
- Tala om för din läkare om du har leverproblem: ta inte Agomelatine Mylan om så är fallet.

## Innan du börjar ta Agomelatine Mylan

### Patientkort

## Agomelatine Mylan

Agomelatine Mylan (agomelatin) tillhör en grupp läkemedel som kallas antidepressiva läkemedel och används för behandling av depression.

För att få bäst nytta av ditt läkemedel följ läkarens anvisningar om hur du ska ta agomelatin (dos, behandlingens längd, uppföljningsbesök, blodprov).

### Rekommendationer för att undvika leverrelaterade biverkningar

Agomelatin kan orsaka biverkningar som kan påverka din leverfunktion.

Denna guide ger dig vägledning i:

- hur leverrelaterade biverkningar kan undvikas
- vad du ska göra om du får leverrelaterade biverkningar under behandlingen med agomelatin.

Fråga din läkare för mer information

Läs bipacksedeln som finns i agomelatinförpackningen för ytterligare information.

### Rapportering av biverkningar

www.fimea.fi  
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet  
Fimea, Biverkningsregistret, PB 55, 00034 FIMEA

Klipplinje

Viklinje

Vik i hälften igen

Klipp ut patientkortet och vik i hälften

Patientkort  
UNDERVISNINGAR