

Säkerhetsinformation till patienter.
Ha alltid detta kort med dig.

Patientkort

Viktig säkerhetsinformation för akutvårdspersonal

Jinarc® kan orsaka leverskada. Leverfunktionstester måste utföras regelbundet (varje månad de första 18 månaderna, sedan var 3:e månad). Vid tecken på leverskada eller onormal förhöjning av ALAT och ASAT skall behandling med Jinarc® omedelbart avslutas.

Jinarc® blockerar verkan av vasopressin i njuren och leder till en ökad urinering och svår uttorkning. Symptom av uttorkning kan omfatta ökad törst, muntorrhet, trötthet, minskad urinproduktion, huvudvärk, torr hud, yrsel, ökad hjärtrytm och förvirring.

Det finns mer information på www.laakeinfo.fi.

Patientens namn:

Datum då Jinarc® förskrevs första gången:

Läkarens namn:

Sjukhus respektive klinikens namn:

Kontaktnummer till kliniken:

Viktig säkerhetsinformation för patienter

Jinarc® kan påverka hur levern fungerar.

Vänd dig till din läkare om du får symtom som trötthet, förlorad aptit, smärta i buken, feber, mörk urin, gul hud/gula ögon (gulsot), svår uttorkning, illamående, kräkning, klåda eller led-och muskelsmärta med feber.

Jinarc® kan orsaka svår uttorkning.

Drick mycket vätska för att undvika uttorkning och vänd dig till din läkare om du inte kan dricka vätska.