

Turvallisuuden liittyviä neuvoja potilaille.
Ole hyvä ja pidä tämä kortti aina mukanas.

Potilas kortti

Tärkeitä turvallisuustietoja ensihoitajille

Jinarc® voi aiheuttaa maksavaurion. Maksakokeet on akuukausittain ja sen jälkeen 3 kuukauden välein). Jos hoidon aikana havaitaan maksavaurioon viittaavia oireita tai merkkejä tai poikkeavan suuria ALAT- tai ASAT-arvoja, Jinarc-hoito on keskeytettävä välittömästi.

Jinarc® estää vasopressiinin toimintaa munuaisissa ja lisää virtsaneritystä ja aiheuttaa vaikeaa elimistön kuivumista. Nestehukan oireita voivat olla jano, suun kuivuminen, väsymys, vähentynyt virtsaneritys, päänsärky, kuiva iho, huimaus, sydämen tykyttely ja sekavuus.

Lisätietoja on saatavilla sivustolla www.laakeinfo.fi.

Potilaan nimi:

Jinarc®-valmisteen ensimmäinen määräämispäivä:

Lääkärin nimi:

Sairaalan hoitokeskuksen nimi:

Hoitokeskuksen puhelinnumero:

Tärkeitä turvallisuustietoja potilaille

Jinarc® voi vaikuttaa maksan toimintaan.

Ota yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee väsymystä, ruokahaluttomuutta, vatsakipua, kuumetta, virtsan tummuutta tai ihon tai silmien keltaisuutta, vaikeaa kuivumista, pahoinvointia, oksentelua, kutinaa tai nivel- ja lihaskipua yhdessä kuumeen kanssa.

Jinarc® voi aiheuttaa vaikeaa elimistön kuivumista.

Juo runsaasti nesteitä kuivumisen estämiseksi ja ota yhteys lääkäriin, jos et pysty nauttimaan nesteitä suun kautta.