

Mitä minun on tiedettävä Lariam®-tableteista?

- Lariam® on reseptilääke, jota käytetään malarian estoon ja hoitoon. Malaria on hengenvaarallinen infektio. Lariam® ei tehoa kaikkiin malariatyypppeihin.
- Ota Lariam®-tabletteja lääkärin antaman ohjeen mukaan ennen kuin matkustat, matkasi aikana sekä malaria-alueelta palattuasi.
- Älä ota Lariam®-tabletteja, jos sinulla on tai on joskus ollut mielenterveyden häiriöitä, koska Lariam® saattaa aiheuttaa joillekin henkilöille vakavia mielenterveyden häiriöitä, kuten **itsemurhan toteuttamisen**,

itsemurha-ajatuksia ja itsetuhoista käyttäytymistä.

Älä ota Lariam®-tabletteja, jos sinulla on tai on joskus ollut:

- masennusta, itsemurha-ajatuksia
- muita mielenterveyshäiriöitä, kuten ahdistuneisuushäiriö, skitsofrenia tai psykoosi (kosketuksen menettäminen todellisuuteen)
- kohtauksia (kouristuskohtauksia tai kouristelua)
- allergia kiniinille, kinidiinille, Lariam®-tableteille tai jollekin näiden tablettien apuaineista
- vaikea-asteisia maksan toimintahäiriöitä
- mustavesikuumetta (malarian

komplikaatio, joka vaikuttaa vereen ja munuaisiin).

Älä ota Lariam®-tabletteja, jos parhaillaan käytät malarialääkettä, jota kutsutaan halofantriiniksi.

Milloin minun on käännättävä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen?

- Lariam®-tablettien käytön aikana on tärkeää olla tietoinen niiden mahdollisista haittavaikutuksista. Lariam®-tablettien käytön yhteydessä saattaa esiintyä neuropsykiatrisia haittavaikutuksia.
- Älä aloita Lariam®-tablettien käyt-

tämistä, jos sinulla on tällaisten tapahtumien kehittymisen riski.

(Ks. kohta **Älä ota Lariam®-tabletteja, jos**).

Lariam® saattaa aiheuttaa joillekin henkilöille vakavia mielenterveyden häiriöitä. Kerro heti lääkärille, jos sinulla esiintyy jotakin seuraavista Lariam®-tabletteja käyttäessäsi:

- itsemurha-ajatuksia
- itsetuhoista käyttäytymistä
- voimakasta ahdistuneisuutta
- epäilyksen tunteita muita kohtaan
- näkö- tai kuuloharjoja
- masennusta
- levottomuuden tunnetta

- poikkeavaa käyttäytymistä tai
- sekavuuden tunnetta
- unettomuutta
- poikkeavia unia/painajaisia.

Hakeudu heti lääkäriin.

Lariam®-tablettien käyttö on heti lopetettava ja on siirryttävä käyttämään jotakin toista malarian estolääkitystä.

Muita Lariam®-tablettien haittavaikutuksia saattavat olla kohtaukset (kouristuskohtaukset tai kouristelu), maksan toimintahäiriöt, sydämen toimintahäiriöt, pahoinvointi, oksentelu, ripuli, vatsakipu, heitehuimaus tai tasapaino-ongelmat (kiertohuimaus), päänsärky, univaikeudet (unisuus, unettomuus, painajaiset).

Miten Lariam®-tabletteja otetaan:

- Ota tabletit kerran viikossa aina samana viikonpäivänä.
- Ota ensimmäinen Lariam®-annos 10 päivää ennen matkasi alkamista, jotta voidaan varmistaa, että Lariam® sopii sinulle.
- Ota toinen annos 3 päivää ennen matkasi alkamista.
- Jatka tablettien ottamista koko matkasi ajan ja vielä 4 viikon ajan kotiin palattuasi.

