

# RoActemra® (tocilizumab)

## Patientkort

Riskhanteringsmaterial, version 3  
Godkänt av Fimea 17.1.2019

Detta patientkort är ett krav för marknadsgodkännandet av RoActemra och innehåller viktig säkerhetsinformation som du måste känna till innan och under behandling med RoActemra. Detta patientkort ska läsas tillsammans med RoActemra patientbroschyr (som du får av din läkare) och RoActemras bipacksedel som finns i förpackningen med läkemedlet. De innehåller viktig information om RoActemra och användarinstruktioner.

**Ha med dig detta kort i åtminstone 3 månader efter den sista RoActemra-dosen**, eftersom biverkningar kan förekomma under en viss tid efter den sista dosen med RoActemra givits. Om du eller barnet som behandlas upplever några ogynnsamma effekter och tidigare har behandlats med RoActemra, ska du kontakta sjukvårdspersonal för råd.

### Datum för behandling med RoActemra:\*

**Start:** \_\_\_\_\_

**Senaste behandling:** \_\_\_\_\_

<b>Administreringssätt:</b>	Injektion under huden (subkutan injektion)	I en ven (intravenös infusion)
	<input type="checkbox"/> SC	<input type="checkbox"/> IV

**Nästa schemalagda behandling:** \_\_\_\_\_

\* Se till att du har en förteckning över alla läkemedel du eller ditt barn använder vid alla besök hos läkare eller sjukskötare.

### Kontaktinformation

Patientens namn: \_\_\_\_\_

Läkarens namn: \_\_\_\_\_

Läkarens telefonnummer: \_\_\_\_\_

### RoActemra patientkort

Detta patientkort innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver vara medveten om före och under behandling med RoActemra.

- **Visa detta kort för ALL sjukvårdspersonal som är involverad i patientens vård**

Detta patientkort ska läsas tillsammans med RoActemra patientbroschyren (du får den av din läkare) och RoActemras bipacksedel som tillhandahålls med ditt läkemedel. De innehåller viktig information om RoActemra inklusive användarinstruktioner.

## Infektioner

Du eller barnet som behandlas ska inte få RoActemra om du/ barnet har en aktiv allvarlig infektion. Dessutom kan vissa tidigare infektioner återkomma när RoActemra används.

- Tala med läkaren om eventuella vaccinationer du eller barnet som behandlas kan behöva ta innan behandling med RoActemra påbörjas
- Kontakta läkare om du eller barnet som behandlas utvecklar några tecken/symtom (såsom ihållande hosta, avmagring/ viktnedgång, låg feber) som tyder på en tuberkulosinfektion som uppstår under eller efter behandling med RoActemra. Du eller barnet som behandlas ska ha undersökts för och inte ha någon aktiv tuberkulos innan påbörjad behandling med RoActemra
- Yngre barn kan ha svårare att kommunicera sina symtom och därför ska föräldrar/vårdnadshavare till yngre barn kontakta sjukvårdspersonal omedelbart om barnet av okänd anledning inte mår bra
- Fråga läkaren om du eller barnet som behandlas bör skjuta upp nästa behandlingstillfälle om du eller barnet som behandlas har någon slags infektion (även en förkylning) vid tidpunkten för nästa schemalagda behandling
- RoActemra normaliserar CRP-nivåer, men en låg CRP-nivå utesluter inte möjlighet till infektion. Det är viktigt att observera andra tecken som kan tyda på infektion.

## Allergiska reaktioner

Allvarliga allergiska reaktioner, inklusive anafylaxi, har rapporterats i samband med RoActemra. Sådana reaktioner kan vara mer allvarliga, och potentiellt livshotande, hos patienter som haft allergiska reaktioner under tidigare behandling med RoActemra.

Intravenös infusion (i.v.) (på mottagning)	Subkutan injektion (s.c.) (på mottagning eller i hemmet)
Under en intravenös infusion kommer läkaren eller sjuksköterskan noggrant övervaka eventuella tecken på allergisk reaktion.	Läkaren kommer att bedöma om patienten själv kan injicera RoActemra subkutant i hemmet. Om patienten upplever några symtom som tyder på en allergisk reaktion ska de <b>inte</b> ta nästa dos förrän patienten har informerat sin läkare OCH läkaren har sagt till dem att de ska ta nästa dos.
Om en allvarlig överkänslighetsreaktion (som kallas anafylaxi) uppkommer, ska administreringen av RoActemra omedelbart avbrytas och lämplig medicinsk behandling påbörjas samt behandling med RoActemra ska avslutas helt och hållet. Symtomen inkluderar följande: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Utslag, klåda eller nässelutslag</li><li>▪ Andfåddhet eller andningssvårigheter</li><li>▪ Uppsvullna läppar, tunga eller ansikte</li><li>▪ Bröstsmärta eller tryck över bröstet</li><li>▪ Känsla av yrsel eller svimfärdighet</li><li>▪ Allvarlig magsmärta eller kräkningar</li><li>▪ Mycket lågt blodtryck.</li></ul>	

## Komplikationer av divertikulit

### (inflammerade fickbildningar på tarmen)

Patienter som använder RoActemra kan utveckla komplikationer av divertikulit som kan bli allvarliga om de inte behandlas.

- **Sök omedelbart vård** om du eller barnet som behandlas utvecklar buksmärta eller kolik med ändrade tarmtömningsvanor eller märker att det är blod i avföringen
- Informera läkaren om patienten har eller har haft magsår eller divertikulit (inflammerade fickbildningar på tarmen)

## Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: **www.fimea.fi**

Säkerhets- och utvecklingscentret för

läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

För fullständig information om alla eventuella biverkningar, se bipacksedeln för RoActemra, som finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) ([www.ema.europa.eu](http://www.ema.europa.eu)).