

UUSI KEUHKOAHTAUMATAUTILÄÄKKEESI

Potilaskortti

- ▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan: [www-sivusto: www.fimea.fi](http://www.fimea.fi), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, FI-00034 Fimea. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

Hyvä potilas / potilaan läheinen

Lääkärisi on määrännyt sinulle Daxas[®]-valmistetta keuhkohtaumataudin hoitoon. Muista kertoa lääkärillesi, jos sinulla on ollut jokin seuraavista:

- syöpä
- unettomuus, ahdistuneisuus, masennus, itsemurha-ajatukset tai itsemurhakäyttäytyminen
- MS-tauti tai SLE (systeminen lupus erythematosus)
- tuberkuloosi, herpes, herpes zoster (vyöruusu), hepatiitti tai HIV-infektio.

Kerro lääkärillesi myös, jos sinulle tulee hoidon aikana seuraavia oireita:

- unettomuus, ahdistuneisuus, masennus, mielialan tai käytöksen muutokset, itsemurha-ajatukset tai itsemurhakäyttäytyminen
- vaikea infektio.

Kerro lääkärillesi, jos käytät muita lääkkeitä.

Daxas[®] voi aiheuttaa joillekin potilaille tahatonta painonlaskua, joka ei liity ruokavalioon tai liikuntaan. On suositeltavaa, että punnitset itsesi säännöllisesti ja merkitset painosi tämän potilaskortin takana olevaan taulukkoon.

Ota tämä kortti mukaasi jokaiselle lääkärikäynnille, jotta lääkäri voi seurata painoasi.

KIRJAA PAINOSI SÄÄNNÖLLISESTI

Punnitse itsesi kahden viikon välein

PÄIVÄMÄÄRÄ	PAINO	MERKINTÖJÄ