

Patientens namn:

Läkarens namn:

Läkarens tel.nr:

Detta patientkort innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till innan och under behandling med Simponi.

Visa detta kort vid varje tillfälle som du besöker läkare.

3. Datum för Simponibehandling

1:a administreringen

/ /

Fortsatta administreringar:

/ /

/ /

/ /

Det är viktigt att du och din läkare noterar varumärke och batchnummer på ditt läkemedel.

4. ÖVRIG INFORMATION

- Se till att du alltid har en lista med dig på alla övriga läkemedel som du använder när du besöker sjukvården.
- Ha alltid med dig detta kort i 6 månader efter din sista Simponidos, eftersom biverkningar kan uppträda långt efter sista dosen.
- Läs bipacksedeln för Simponi noggrant innan du börjar använda detta läkemedel.



MSD

MSD Finland Oy. All rights reserved. MULT-1275712-0000 3/2019



Simponi[®]
golimumab

SIMPONI patientkort

1. INFEKTIONER

Du kan lättare få infektioner när du behandlas med Simponi. Infektioner kan utvecklas snabbare och vara allvarigare. Dessutom kan tidigare infektioner återkomma.

1.1. Före Simponibehandling:

- Tala om för din läkare om du har en infektion. Du får inte behandlas med Simponi om du har tuberkulos (TBC) eller någon annan allvarlig infektion.
- Din läkare kommer att undersöka om du har tuberkulos. Det är mycket viktigt att du talar om för din läkare om du

någonsin har haft tuberkulos eller om du har varit i nära kontakt med någon som har haft tuberkulos.

- Tala om för din läkare om du vet eller misstänker att du är bärare av hepatit B-virus.

1.2. Under och efter Simponibehandling

- Uppsök omedelbart läkarvård om du har tecken på en infektion. Sådana tecken omfattar feber, trötthetskänsla, (ihållande) hosta, andfåddhet, influensaliknande symtom, viktminskning, nattliga svettningar, diarré, sår, tandbesvär och sveda vid urinering.

2. HJÄRTSVIKT

2.1. Före Simponibehandling

- Tala om för din läkare om du har eller har haft hjärtsvikt. Du får inte behandlas med Simponi om du har måttlig till svår hjärtsvikt.

2.2. Under och efter Simponibehandling

- Uppsök omedelbart läkarvård om du märker tecken på hjärtsvikt (t.ex. andfåddhet eller svullna fötter).

Be din läkare att notera typ och datum för senaste tuberkulosundersökning nedan.

Undersökning _____

Datum _____ **Resultat** _____

Undersökning _____

Datum _____ **Resultat** _____