

Potilaan varoituskortti

Pidä tämä kortti aina mukanasasi ja näytä se aina jokaiselle tapaamallesi lääkärille, hoitajalle tai apteekkihenkilökunnalle.

Tärkeää turvallisuustietoa Forxigasta (dapagliflotsiini) – koskee vain tyyppin 1 diabetesta

Diabeettisen ketoasidoosin oireita ovat:

Suu ja vatsa: Huonovointisuus tai yleinen sairauden tunne, mahakipu, voimakas jano/suun kuivuus (elimistön kuivumisen oireita), makea tai metallinen maku suussasi.

Hengitys, hengittäminen ja haju: Nopea ja syvä hengittäminen, makealta tuoksuva hengitys, muutos virtsan tai hien hajussa.

Muita oireita: Veren tai virtsan kohonnut ketoainepitoisuus, nopea painonlasku, sekavuus, epätavallinen uneliaisuus tai väsymys.

Jos sinulla on diabeettisen ketoasidoosin oireita, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai sairaalaan ja lopeta heti Forxigan käyttö.

Muista:

Potilailla, jotka käyttävät Forxigaa, voi ilmaantua diabeettinen ketoasidoosi, vaikka verensokeritaso olisi alle 14 mmol/l (250 mg/dl). Tätä kutsutaan nimellä euglykeeminen diabeettinen ketoasidoosi.

Sinun ja lääkärisi yhteystiedot



Nimesi:

Lääkärisi nimi:

Lääkärin puhelinnumero:

Forxiga-hoidon aloituspäivämäärä:

Omainen tai ystävä, johon tulee olla yhteydessä hätätilanteessa:

Omaisien tai ystäväiden puhelinnumero:



Tämä potilas käyttää Forxigaa (dapagliflotsiini) tyypin 1 diabetes mellituksen hoitoon.

- Sitä käytetään insuliinihoidon lisänä.
- Se on tyypiltään SGLT2-estäjä.

Lopeta Forxiga-hoito tilapäisesti ennen leikkaustoimenpiteitä tai sairaalahoitoon johtavan vakavan akuutin sairastumisen vuoksi.

Arvioi potilaan diabeettisen ketoasidoosin (DKA) mahdollisuus välittömästi, jos hänellä on diabeettisen ketoasidoosin oireita

- Arvioi diabeettisen ketoasidoosin mahdollisuus riippumatta potilaan verensokeripitoisuudesta.
- Potilailla, jotka käyttävät Forxigaa, diabeettinen ketoasidoosi voi ilmaantua, vaikka verensokeritaso olisi alle 14 mmol/l (250 mg/dl). Tätä kutsutaan nimellä euglykeeminen diabeettinen ketoasidoosi.

Diabeettisen ketoasidoosin hoitaminen

- **Jos epäilet diabeettista ketoasidoosia:** saata potilas välittömästi lääkärin hoitoon ja lopeta Forxiga-hoito heti.
- **Euglykeemisen diabeettisen ketoasidoosin hoito vaatii:** lisähiilihydraatteja insuliinin ja nesteiden lisänä

Älä lopeta tai keskeytä insuliinihoitoa missään tilanteessa.

Jos sinulla on haittavaikutuksia, kerro niistä apteekkihenkilökunnalle, lääkärillesi tai hoitajallesi. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu pakkausselosteessa.

Voit ilmoittaa haittavaikutuksista:

Fimeaan

Lääkealan turvallisuus- ja

kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

www.fimea.fi

tai

suoraan myyntiluvan haltijalle

<https://aereporting.astrazeneca.com>

Haittavaikutusilmoitusta tehdessäsi, muista mainita, että sinulla on tyypin 1 diabetes.

Tämä materiaali, Potilaan ja omaisen

opas sekä pakkausseloste ovat

sähköisesti saatavilla verkkosivulta

www.potilas-rmp.forxiga.fi