

TOUJEO[®] (INSULIN GLARGIN 300 enheter/ml)

Toujeo[®] 300 E/ml SoloStar[®], injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Toujeo[®] 300 E/ml DoubleStar[™], injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

GUIDE FÖR PATIENTER OCH/ELLER VÅRDGIVARE

- Om Toujeo[®] har förskrivits till dig, bör hälso- eller sjukvårdspersonalen visa dig hur man använder Toujeo[®] -pennan och du måste noggrant läsa bruksanvisningen i bipacksedeln som medföljer pennan.
- Denna guide är endast avsett för vägledning.
- Starta med den dos som du har blivit förskrivnen.

Viktig information om justeringar de första veckorna vid förskrivning av Toujeo[®]

- Insulin glargin 300 enheter/ml (Toujeo[®]) och insulin glargin 100 enheter/ml är **inte bioekvivalenta och är därför inte direkt utbytbara utan dosjustering** (Med detta menas att det inte är samma läkemedel och att du inte får växla mellan dem utan att justera dosen).
- Byte från en insulinbehandling till en annan ska göras endast efter ordination från läkare. Den dos som senast rekommenderades av hälso- eller sjukvårdspersonalen ska alltid följas.
- Ditt blodsocker behöver följas noga under övergången och de efterföljande veckorna.
- Toujeo[®] (insulin glargin 300 E/ml) finns tillgängligt i två olika pennor:



Dosinställningen med Toujeo[®] SoloStar[®] är 1 enhet åt gången och med

Toujeo[®] DoubleStar[™] är den 2 enheter åt gången.

Den dos som levereras är den som visas i doseringsfönstret.

Kontakta hälso- eller sjukvårdspersonalen för ytterligare information.

Läs bruksanvisningen som finns i bipacksedeln före injicering av Toujeo[®].

Om du får några biverkningar eller vid felmedicinering, tala med din läkare eller med apoteket, eller rapportera till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea: www.fimea.fi.

Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Du kan också rapportera biverkningar till innehavaren av godkännandet för försäljning: pharmacovigilance.finland@sanofi.com eller tel. 0201 200 368.