

Paracetamol Fresenius Kabi

10 mg/ml infuusioneste, liuos

Yliannosriski vastasyntyneille, imeväisikäisille ja alipainoisille aikuisille laskimoon annettavan parasetamolien annosteluvirheen yhteydessä

Käyttöaihe: Kohtalaisen kivun lyhytaikaiseen hoitoon, etenkin leikkauksen jälkeen sekä kuumeen lyhytaikaiseen hoitoon, kun laskimoon anto on kliinisesti perusteltua kivun tai kuumeen hoitamiseksi kiireellisesti ja/tai kun muiden antoreittien käyttö ei ole mahdollista.⁽¹⁾

ANNOSTUS PERUSTUU POTILAAN PAINOON. ANNETTAVA TILAVUUS VOI OLLA HYVIN PIENI.

Annos perustuu potilaan painoon⁽¹⁾

	Potilaan paino ≤ 10 kg	Potilaan paino > 10 kg – ≤ 50 kg
Leikkaussaliin	7,5 mg/kg eli 0,75 ml/kg	15 mg/kg eli 1,5 ml/kg
↓ Antoväli vähintään 4 tuntia	7,5 mg/kg	15 mg/kg
	Enintään neljä 7,5 mg/kg parasetamoliannosta, ei saa ylittää annosta 30 mg/kg/24 tuntia	Yksi infuusio laskimoon annoksella 15 mg/kg/4–6 tuntia, ei saa ylittää annosta 60 mg/kg/24 tuntia

(Annostus mainittu mg:na parasetamolia per painokg)

<p>Paracetamol Fresenius Kabi 10 mg/ml, 50 ml 1 ml = 10 mg</p> <p>Tarkoitettu vain täysiaikaisten vastasyntyneiden, imeväisikäisten, leikki-ikäisten ja alle 33 kg painavien lasten hoitoon⁽¹⁾</p> 	<p>- Täysiaikaiset vastasyntyneet, imeväisikäiset, leikki-ikäiset ja enintään 10 kg painavat lapset: 7,5 mg/kg eli 0,75 ml/kg antokertaa kohden, enintään 4 kertaa vuorokaudessa.</p> <p>- Yli 10 kg ja enintään 33 kg painavat lapset: 15 mg/kg eli 1,5 ml/kg antokertaa kohden, enintään 4 kertaa vuorokaudessa.</p>	<p>Paracetamol Fresenius Kabi 10 mg/ml, 100 ml 1 ml = 10 mg</p> <p>Tarkoitettu vain aikuisten, nuorten ja yli 33 kg painavien lasten hoitoon⁽¹⁾</p> 	<p>- Aikuiset ja yli 50 kg painavat nuoret: ks. valmisteyhteenveto</p> <p>- Yli 33 kg painavat lapset sekä enintään 50 kg painavat nuoret ja aikuiset: 15 mg/kg eli 1,5 ml/kg antokertaa kohden, enintään 4 kertaa vuorokaudessa.</p>
Annostusesimerkkejä			
Lapsen paino	Annettava tilavuus		
2 kg	1,5 ml		
2,5 kg	1,8 ml		
3 kg	2,25 ml		

- Jos lapsen paino on pieni, Paracetamol Fresenius Kabi voidaan laimentaa 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridiliuoksella tai 50 mg/ml (5 %) glukoosiliuoksella pitoisuuteen 1/10.
- Tarkista yliannosriskin välttämiseksi, etteivät muut samanaikaisesti käytetyt lääkkeet sisällä joko parasetamolia tai propasetamolihydrokloridia.
- Huomioi yliannoksen yhteydessä seuraavat tiedot (tarkista tarkemmat tiedot valmisteyhteenvedosta ja toksikologian asiantuntijalta): sairaalahoido, oireenmukainen hoito, N-asetyylikysteiinin (vasta-aine) anto, verinäytteet (maksan toimintakokeet, plasman parasetamolimääritys). Hemodialyysin vaikutus on vähäinen. Vaikeissa tapauksissa maksan siirto voi olla tarpeen.

(1) Paracetamol Fresenius Kabin valmisteyhteenveto

 **FRESENIUS
KABI**
caring for life