

## Hur Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på flaskan och kartongen efter {Utg.dat}.  
Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen för att skydda mot fukt. Tillslut flaskan väl.

### **Innehavare av godkännande för försäljning:**

ratiopharm Oy  
info@ratiopharm.fi  
Tel. 020 180 5900

Du kan rapportera alla misstänka biverkningar  
via det nationella rapporteringssystemet till

### **Säkerhets-och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea**

Biverkningsregistret  
PB 55  
00034 FIMEA  
(www.fimea.fi)

och/eller direkt till innehavaren av  
försäljningstillståndet till e-mail address:  
safety.finland@tevaeu.com

Datum: 8.10.2018

FI/GEN/18/0162/10/2018

## VIKTIG INFORMATION

# Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva

**Viktig information om Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva för att minska risken för infektion med humant immunbristvirus (hiv-infektion).**

**Information till personer som ordinerats Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva som profylax före exponering (PrEP). (Delas ut av förskrivande läkare.)**

Denna guide är avsedd endast för information och bör komplettera (inte ersätta) bipacksedeln som följer med ditt läkemedel.  
För fullständig lista över biverkningar och annan viktig information hänvisas till bipacksedeln som finns i kartongen med läkemedlet.  
Fråga din läkare om du har några frågor.

**ratiopharm**

**TEVA**

Group Member

FI/GEN/18/0162/10/2018

FI/GEN/18/0162/10/2018

## VIKTIG INFORMATION

### Hur används Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva för PrEP?

**Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva är ett receptbelagt läkemedel som används för att minska risken att infekteras med hiv-1, hos vuxna, i kombination med säkert sex.**

### Vad du bör veta innan och när du tar Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva för att minska risken för att få hiv-infektion

**Du måste vara hiv-negativ innan du börjar ta Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva som PrEP. Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva kan endast hjälpa till att minska risken att få hiv innan du smittas. Du måste bli testad för att säkerställa att du inte redan har en hiv-infektion. Ta inte Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva för att minska din infektionsrisk om det inte har bekräftats att du är hiv-negativ.**

Tala om för din läkare om du haft influensaliknande symtom antingen under månaden innan behandlingen inleds med Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva, eller när som helst medan du tar Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva. Om du inte haft säkert sex finns risken att få hiv. Dessa symtom kan vara tecken på hiv-infektion:

- ◆ trötthet
- ◆ feber
- ◆ led- eller muskelsmär
- ◆ huvudvärk
- ◆ kräkningar eller diarré
- ◆ hudutslag
- ◆ nattsvettningar
- ◆ förstörade lymfkörtlar i halsen eller ljumsken

**Ta Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva som ordinerat av din läkare. Hoppa inte över någon dos av Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva och sluta inte att ta Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva. Glömda doser och oregelbundet intag ökar risken för att få hiv och att eventuellt utveckla resistens mot läkemedlet om du blir smittad med hiv.**

- ◆ Testa dig regelbundet för hiv (t. ex. åtminstone var 3:e månad).
- ◆ Om du tror att du har infekterats med hiv, berätta omedelbart för din läkare. Läkaren kan vilja utföra flera tester för att säkerställa att du fortfarande är hiv-negativ.
- ◆ **Att bara ta Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva förhindrar inte att du får hiv. Du måste fortsätta med säkert sex** medan du tar Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva för att minska risken för att få hiv:
  - Använd kondom för att minska kontakten med sädesvätska, vaginalvätskor eller blod och undvik att utsätta dig för sexuellt överförbara sjukdomar.
  - Dela inte personliga saker där det kan finnas blod eller kroppsvätskor, t.ex. tandborstar och rakblad.
  - Dela inte och återanvänd inte nålar eller annan injiceringseller läkemedelsutrustning.

#### ◆ **Åtgärder för minska risken för hiv samtidigt som du tar Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva som PrEP:**

- Testa dig för andra sexuellt överförbara infektioner, som syphilis och gonorré. Dessa infektioner gör det lättare att få en hiv-infektion.
- Skaffa dig information och stöd för att minska ett sexuellt riskbeteende.

#### ◆ **Ta reda på om du har hepatit B-virus (HBV)-infektion innan du börjar ta Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva.**

Om du har HBV-infektion, finns det en allvarlig risk för att leverproblem kan förvärras när du slutar ta Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva.

### Hur du tar Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva

**Ta alltid Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva exakt enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.**

- ◆ Den rekommenderade dosen är en tablett Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva dagligen. När det är möjligt, bör Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva tas tillsammans med föda. Ta Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva varje dag, inte bara när du tror att du utsatts för risk att få hiv-infektion.

- Missa inte någon dos av Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva och sluta inte att ta det såvida inte din läkare sagt det. Missade doser kan öka risken att få hiv-infektion. Om du missar en dos Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva och du upptäcker det:
  - Inom 12 timmar efter den tidpunkt då du brukar ta Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva; ta tablett så snart som möjligt, helst med föda. Ta sedan nästa dos vid den vanliga tidpunkten.
  - Efter 12 timmar eller mer efter den tid då du brukar ta Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva; ta inte den missade dosen. Vänta och ta nästa dos, helst tillsammans med föda, vid den vanliga tiden.
- Om du kräks mindre än 1 timme efter en dos Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva, ta en ny tablett. Du behöver inte ta en ny tablett om du kräks efter mer än 1 timme efter det att du tagit Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva.

### Biverkningar

**Liksom alla läkemedel kan Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.**

Läs bipacksedeln som finns i läkemedelsförpackningen för att få en fullständig lista över möjliga biverkningar.

**Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva kan orsaka allvarliga biverkningar, inklusive nya, eller förvärra njur- och skelettproblem.** Före och under behandlingen kan din läkare ordinera blodprov för att mäta njurarnas funktion. Informera din läkare om du tidigare har haft njursjukdomar eller om prover har visat att du har njurproblem. **Tala om för din läkare om du tror att du har någon allvarlig biverkning som anges i bipacksedeln.**

Mycket vanliga biverkningar hos personer som tar Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva inkluderar: Diarré, illamående, kräkningar, yrsel, huvudvärk, hudutslag och svaghetskänsla.

Tala om för din läkare om du har några biverkningar som besvärar dig eller inte går över. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.