

# VIKTIG INFORMATION

## **ILARIS® (kanakinumab), 150 mg subkutan injektion**

För behandling av Stills sjukdom  
inklusive Stills sjukdom hos vuxna (AOSD) och  
systemisk juvenil idiopatisk artrit (sJIA)

### **Frågor om Novartis läkemedel?**

Novartis Läkemedelsinformationsavdelningen  
tel. 010 6133 210, [novartis.laakeinformaatio@novartis.com](mailto:novartis.laakeinformaatio@novartis.com)

Du kan rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporterings-systemet: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret, PB 55, 00034 FIMEA. **[www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)**

Du kan också rapportera biverkningar direkt till innehavaren av försäljningstillståndet: Novartis Finland Oy, Skogsjungfrugränden 10 02130 Esbo, tel. 010 6133 200, **[www.novartis.fi](http://www.novartis.fi)**

FI1909733093 Del av riskhanteringsplan v 11.2.  
Datum för Fimeas godkännande 28.8.2019.

---

## Innan behandling med kanakinumab påbörjas

- **Infektioner:** Du ska inte behandlas med kanakinumab om du har en aktiv infektion som kräver medicinsk intervention.
- **Vaccinationer:** Om du måste vaccineras, tala med din läkare innan behandling med kanakinumab påbörjas.

## Under behandling med kanakinumab

- **Risk för infektioner:** Användning av kanakinumab är förenad med en ökad risk för infektioner. Detta inkluderar även allvarliga infektioner.
- Om du utvecklar en infektion kan det vara att din behandling med kanakinumab kommer att avbrytas. Informera din läkare omedelbart om du har feber som varar längre än 3 dagar eller har andra symptom som kan bero på infektion.
- Kontakta en läkare **omedelbart** om du får någon av följande biverkningar: ihållande feber, hosta eller huvudvärk, eller, lokal hudrodnad, värmekänsla eller hudsvullnad, eller ihållande hosta, viktnedgång eller lindrig feber.
- **Makrofagaktiveringssyndrom (MAS):** Patienter med Stills sjukdom kan utveckla ett tillstånd som kallas Makrofagaktiveringssyndrom (MAS), vilket kan vara livshotande. Informera din läkare omedelbart om dina symptom på Stills sjukdom bli värre eller du har symptom som kan bero på infektionen.
- **Graviditet:** Om du har fått kanakinumab medan du var gravid, är det viktigt att du informerar barnets läkare eller annan sjukvårdspersonal innan vaccinationer ges till ditt barn. Ditt barn ska inte få levande vacciner förrän tidigast 16 veckor efter att du fick din sista dos av kanakinumab medan du var gravid.

---

## Indikation:

Ta också med dig **EN FÖRTECKNING ÖVER ALLA DINA MEDICINER** till varje besök inom sjukvården.

Patientens namn: \_\_\_\_\_

För barn: Föräldrars/vårdnadshavares namn: \_\_\_\_\_

Datum för första dosen kanakinumab: \_\_\_\_\_

Dos kanakinumab administrerad: \_\_\_\_\_

Läkarens namn: \_\_\_\_\_

Läkarens tel: \_\_\_\_\_